

Woll

AUS DER UNIVERSITÄTS - KINDERKLINIK

DIREKTOR: PROFESSOR Dr.med.DE RUDDER

BEOBACHTUNGEN ÜBER MENINGOCOCCENMENINGITIS UND
MENINGOCOCCEN-SEPSIS AN DER UNIVERSITÄTS-KINDER-
KLINIK FRANKFURT AM MAIN IN DEN JAHREN 1935 - 1953
MIT NACHUNTERSUCHUNGEN DER MIT DAUERSCHÄDEN ENT-
LASSENEN PATIENTEN UND NACHUNTERSUCHUNG DER GE-
HEILT ENTLASSENEN PATIENTEN DES JAHRGANGES 1950.

INAUGURALDISSERTATION ZUR ERLANGUNG DER DOKTORWURDE
IN DER GESAMTEN MEDIZIN DER HOHEN MEDIZINISCHEN FA-
KULTÄT DER JOHANN-WOLFGANG-GOETHE-UNIVERSITÄT ZU
FRANKFURT AM MAIN.

vorgelegt von

Rose W o i t

aus Alt-Strunz/Schlesien

am 22.XII.1955

- A
1. Erkrankungszahlen der einzelnen Jahrgänge.
 2. Verteilung der Erkrankungen auf die Jahreszeiten
 3. Altersverteilung der Meningococceninfekte.
- B
- B e g i n n u n d V e r l a u f d e r M e n i n g o c o c c e n - E r k r a n k u n g e n .
- a Auftreten der Meningococcenerkrankungen nach Vorkrankheiten oder nach Resistenzverminderungen des Körpers.
 - b Meningococceninfekt Meningitis.
 - c Meningococceninfekt Sepsis.
(Waterhouse-Friderichsen-Syndrom.)
 - d Komplikationen beider Verlaufsformen:
Pneumonien, Otitiden, Panophthalmien,
Folgen der Hirnmetastase: Hydrocephalus, Paresen,
encephalitische Bilder.
- C
- D a u e r s c h ä d e n u n d N a c h u n t e r s u c h u n g e n d e r m i t D a u e r s c h ä d e n e n t l a s s e n e n K i n d e r .
- D
- E r g e b n i s s e d e r N a c h u n t e r s u c h u n g e n d e r g e h e i l t e n t l a s s e n e n K i n d e r d e s J a h r g a n g e s 1 9 5 0 .

In der folgenden Arbeit werden an Hand von Krankenberichten und Nachuntersuchungsbefunden Beobachtungen über die Meningococcen-meningitis und die M.-Sepsis an der Universitäts-Kinderklinik Frankfurt am Main mitgeteilt.

Zur Vermittlung einer Übersicht über das zur Verfügung gehabte Material werden einige statistische Betrachtungen an den Anfang gestellt.

Aus der Tabelle I ist ersichtlich, dass die M.-Infekte in den Jahren 1935-1938 sporadisch auftraten. Die meningitische Form überwog. 1939 zeigt ein Ansteigen der meningitischen Erkrankungen auf 16, denen nur 4 septische gegenüberstehen. Etwa parallel dem weiteren Anstieg der meningitischen Fälle auf 24 erfolgt 1940, in dem Jahr, das den einen Gipfel der Morbiditätszahlen der Beobachtungszeit aufweist, ein Anstieg der Sepsis auf 11 Erkrankungen. 1941 übersteigt die Zahl der septischen Erkrankungen die der meningitischen um 3 Fälle. 1942 hat insgesamt nur 10 M.-Infekte, an denen meningitische und septische Form je zur Hälfte beteiligt sind. 1943 zeigt wieder einen Anstieg der Erkrankungen mit 13 Meningitiden und 6 Sepsisfällen. Von 1944 bis 1947 treten die M.-Infekte sporadisch auf. Ab 1948 nimmt die Zahl der Erkrankungen zu und erreicht 1953 mit insgesamt 36 Meningococceninfekten einen zweiten Gipfel in der Beobachtungszeit. Eine absolute Zunahme der Sepsisfälle liegt auf Grund der hier gemachten Beobachtungen nicht vor. Die Zahl der septischen Erkrankungen stieg und fiel parallel der Zahl der meningitischen.

In der Tabelle II wurde festgehalten in welchen Monaten der Erkrankungsbeginn lag. Wir sehen bei den septischen Erkrankungen einen sehr hohen Januargipfel, während die meningitischen Formen einen Märzgipfel aufweisen. Auf die Monate Juli bis Oktober entfallen die geringsten Anzahlen der Erkrankungen. Im November und Dezember ist bereits wieder ein Anstieg zu verzeichnen.

Die Zusammenstellung der Altersverteilung der M.-Infektionen ergibt eine hohe Morbidität der Säuglinge bis zu 6 Monaten. Auch die Letalität ist in dieser

Gruppe am höchsten. Die Kinder erkrankten in diesem Alter siebenmal häufiger an Meningitis als an Sepsis. In den folgenden drei Halbjahren überwiegt ebenfalls noch die meningitische Form, während die Zahl der septischen im Steigen begriffen ist. Das 2. Lebensjahr zeigt doppelt so viele septische Erkrankungen wie meningitische. Durch Meningitis kam keines der zweijährigen Kinder ad exitum, während 12 Zweijährige an Sepsis starben. Auch im 3. Lebensjahr überwog die Anzahl der septischen Erkrankungen. Wie aus der Tabelle ersichtlich ist. Von den 358 M.-Infekten der Beobachtungszeit trafen 275 Kinder unter 4 Jahren. 79 davon waren noch nicht 6 Monate alt. 53 befanden sich im Alter von 6-12 Monaten. Somit fällt über ein Drittel aller hier beobachteten M.-Erkrankungen auf Kinder unter einem Jahr. 132 Kinder waren 1-3 Jahre alt. Die übrigen 83 Fälle verteilen sich auf die verbleibenden 9 Jahrgänge.

Die Behandlung der M.-Erkrankungen erfolgte in den Jahren 1935 bis 1939 mit Meningococcen-Serum i.m. und s.c. und Bluttransfusionen. Von den an dieser Zeit behandelten Meningitiden, es waren 34, starben 13 und von den 10 Sepsisfällen 5.

Die Sulfonamidtherapie stand in den Jahren 1940 - 1946 im Vordergrund. Von 63 Meningitiden starben 15; von 43 Sepsisfällen verliefen 11 letal.

Nach Anwendung der Antibiotica war in der Zeit von 1947 - 1953 ein weiterer Rückgang der Mortalität der Meningitis zu verzeichnen. Von 110 Meningitiden kamen 10 ad finem. Die Sepsis spricht weniger gut auf Antibiotica an. Ihre Letalität bleibt mit 29 Sterbefällen von 91 Erkrankungen gleich hoch.

Die in den menschlichen Organismus eindringenden Keime, seien sie nun vorwiegend saprophytischer oder pathogener Natur, bevorzugen bestimmte, für ihre eigentliche Infektionswege. Höring sagt, daß in jeder der Phylogenese Wirt und Keim sich einander angepaßt haben und sich beide auf die günstigste Form des Zusammenlebens einstellen. So ist auch die Übertragungsweise den Besonderheiten der Symbionten angepaßt und daher entsprechend variant. Der Tetanusbazillus und der *Clostridium botulinum* z.B. halten sich in der Erde auf, bis sie mit ihr in Berührung gekommenen Gegenständen auf und dringen von dort aus in Wunden. Eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch findet man beispielsweise bei Staphylokokken, Pneumokokken und auch Meningokokken. Die direkte Übertragung wird vor allem durch schlechte Lebensverhältnisse (feuchte, zu kleine Wohnungen) und Unsauberkeit begünstigt. Im Aufnahmebericht beobachtet Kinder wird eine starke Verechamung der Extremitäten und bei einigen Säuglingen durch ungenügende Pflege verursachte Macerationen der Gesäßhaut erwähnt. Auch einige Stillesfälle von Beginn der Meningokokkenkrankung lassen auf wenig sorgfältige Behandlung schließen. Die Mütter mehrerer Kinder waren berufstätig und gaben die Kinder tagsüber in Kindergärten. Bei einem handelte es sich um ausserordentliche Kinder, die in Familien oder bei den Großeltern untergebracht waren. Bei den zur Nachuntersuchung vorgestellten 9 Kindern erschienen allein 4 in recht unsauberen Zuständen. Wenn auch die unsorgfältige Pflege nicht völlig ausschlaggebend für ein Zustandekommen der Infektion ist, so dürfte sie jedoch gerade im Kindesalter eine recht bedeutende Rolle spielen.

Als Eintrittspforten benutzen bzw. müssen die Keime den Erreger das Urogenitalsystem, andere die verletzten Haut und die dritte und vierte Art den Magen-Darmtrakt oder die Luftwege benutzen. Bei der Erforschung des Weges, den der Meningococcus in den menschlichen Organismus nimmt, stellte man bereits sehr früh seine Anwesenheit im Nasenrachenraum fest. Es wurde jedoch

leere Zeit angenommen, er gelange von hier aus auf den direkten Wege durch die Laminia cribrifera zu den Sinnesorganen. Diese Anschauung kann heute vielleicht noch in dem einen oder anderen Falle beim Vorliegen eines Traumas, das mit Verletzung der Laminia einhergeht, aufrecht erhalten werden. Es wäre jedoch auch möglich, dass ein Trauma entweder durch Verletzung der Laminia oder durch einen leeren Sturz auf den Kopf und Jän Änderung der Verhältnisse in den Sinnesorganen im ersten Falle durch Abstoß der Eiere, im zweiten ihre Organwandstruktur zerstört und so einen mehr oder weniger bedeutsamen Einfluss auf die Erkrankung hat. In 4 Fällen der beobachteten gekommenen 153 Meningokokkeninfektionen wurde von den Eltern ein Trauma als Ursache angegeben:

1. VI d 23/965 (39) H.Ka. 14 Tage alt, 2 Wochen zu Hause geboren. Bei Aufnahme tonischer Krampf rechts und links Gesichtshälfte, schrilles Schreien nach dem Essen. Liquor leicht gelblich. Geburtstrauma? Eitropfen aus Zellen, vorwiegend Epithel.; Erythrocyten, Eiwasser +, Leukozyten +, Fandy +. Nach L.P. einen Tag nicht geschlafen. Nach 3 Tagen Krämpfe am nächsten Tag Sedativa. Am 12. Klt. Liquor deutlich Eitropfen: viele Eiwasserproben, Erythrocyten positiv, 83 Zellen, reichlichen Ery. Am 15. Klt. Liquor dick-eitrig, Druck nicht erhöht. Meningokokken aus dem Liquor ergab am 16. Klt. blutig-eitrigem Liquor, Eritus am 17. Klt.

Section: Meningitis purulenta, besonders über der Basis. Exocephalus.

2. VI d 15/366 (41) H.Ka. 3/12 J. Vier Tage vor Aufnahme mit Kopf an Holzkiste geschlagen, war nicht bewusstlos. Am Nachmittag des Unfalltages Fieber, Schreien, Berührungsempfindlichkeit, bei dem Unfall keine Schulpfen. Aufnahmebefund: leicht dystrophes Kleinkind, berührungsempfindlich, steif, Kernig +, FVR und Areflexe gesteigert. Bei der L.P. Liquor eitrig, gramnegativ, Meningokokken. Therapie mit Sulfonamiden. Verlauf kompliziert. Unslos.

3 VI e 8/942 Frie., KH (46) 5 8/12 J. Einige Tage vor Beginn der Erkrankung Holzsäbchen in die Nase gestochen, Nasenbluten bei der Aufnahme: Nachts 2 mal Kernig +. Deswegen: Meningitis, Berührungsempfindlichkeit, Benommenheit, Strabismus convergens, Kataract, Schilddrüse mit angesogener Kneuelik eitrige eitrige, nicht sicher nachweisbar. Untersuchung in der Nase, Ohren-Kl. und Rb.-Untersuchung. erreichten keinen Beweis für rhinogene Entstehung der Meningitis. Kind geheilt entlassen.

4 VI e 13/2766 Mu. Pe. (47) 5 2/12 J. Erkrankung wird als M.-Sepsis aufgefasst. - 6 Tage vor Aufnahme mit einem Kiefer auf Schlitten geschlagen, Zahn ausgebrochen, starke Blutung, Gesicht schwell an. Nach zwei Tagen Bettruhe Kind wieder munter. Einen Tag vor Aufnahme häufiges Erbrechen, Kollaps. Am Nachmitt. Auftreten von dunklen Flecken an den Beinen, Gesicht färbte sich später auch dunkel, Kind benommen. Aufnahmebefund: unzählige punktförmige bis linsengrosse Petechien, an mehreren Stellen mehrere bis fünfmarkstückgrosse livide Flecken. Liquor: 561 Zellen, vorwieg. Leuko, keine Mikroben. Kind befand sich in extremem Kreislaufkollaps, Herzstille, fast blutleer. Am Abend des Aufnahmetages Exitus. Sektion: Nebennierenmarkblutung, Hirnschwellung.

Bei Kind Ka. He. konnte auf Grund des xanthochromen Liquors und der im Liquor vorhandenen Erythrocyten mit ziemlicher Sicherheit auf ein Geburtstrauma geschlossen werden. Es scheint auch für die Infektion wegweisend gewesen zu sein, da der Liquor in den ersten Tagen nur xanthochrom war und erst am 15. Kl. eitriger Liquor in dessen Ausstrich sich Meningococcen fanden enthielt wurde.

Kes., Gü. könnte seinen Infekt, wie aus der Erwähnung des schon bestehenden Schnupfens zu schliessen ist ebenfalls bereits vor dem Unfall gehabt haben. Wie weit und ob die heftige Erschütterung des Kopfes zur Beschleunigung bzw. Verschlimmerung eines schwelenden Processes beitrug

die zu 45% positiv ausfielen. Nach Ansicht des Verfassers sagen die Ergebnisse der 100 Agglutinationen aus, dass es bei den Trägern nicht nur stimmen Erfolge und stillen Feiung zu kommen braucht. Da die während einer Grippeepidemie angesteckte Gruppe einen höheren Prozentsatz an positiven Reaktionen aufweist, meint Karl LUTZ, dass es bei einer veränderten Reaktionslage des Organismus zu einer leichten Erkrankung unter gleichzeitiger Antikörperbildung komme.

Diese Untersuchungen bestätigen also die Annahme, dass Meningococcen sich in der Nasenschleimhaut aufhalten können, ohne zu einer Erkrankung zu führen, wenn der Wirtsorganismus genügend widerstandsfähig ist. Bei einem Eindringen der Keime kam es erst, als durch das Eintreten eines anderen Erregers das erlangte Gleichgewicht zwischen Mensch und Keim gestört wurde. Aber auch dann trat keine schwere Erkrankung auf, sondern eine stumme Infektion und Antikörperbildung ein. Ob diese Antikörperbildung nun als Immunisierung des Körpers zu deuten ist, oder ob es sich nach HORING um einen Zustand der Unterimmunisierung oder Hypersensibilisation, in welchen der Körper durch diese Keime vorbereitet wird, wurde nicht gesagt. Einer Mitteilung von Charles MITTELL in Marseilles, zufolge zeigte sich jedoch bei an Tripartiten angestellten Beobachtungen, dass Keimträger nie erkrankten und Erkrankte nie Keimträger waren. Bei einer beträchtlichen Anzahl unserer Patienten war von vornherein eine Schwächung der Resistenz des Körpers zu verzeichnen. Es befanden sich unter den 102 mit einer Meningitis zur Aufnahme gekommenen Flüchtlinge 18 mit einer floriden Rachitis und einer mehr oder weniger ausgebildeten Kranio-tabes.

5 Kinder kamen aus Familien in denen ein Familienglied an Tbc. erkrankt war, 3 Kinder hatten selbst eine Tbc. und bei 22 Kindern war eine Krankheit der Meningitis unmittelbar vorausgegangen.

So trat Meningitis bei einem Kind in der Nasernischaubation, bei einem anderen in der Varicelleninubation auf. 3 Kinder erkrankten einige Tage nach der Lockenschatz-

impfung. Ein Patient wies eine gleichzeitige Infektion mit Bakt. enteritidis Breslau auf. Bei 5 Kindern stellte sich die Meningococceninfektion unmittelbar oder längere Zeit nach einem Keuchhusten ein. Eine 4 Monate alte Frühgeburt, die an einer M.-Erkrankung ad exitum kam, sei als von vornherein resistenzschwach ebenfalls erwähnt.

5 VI d/20 Reu., Gi. (49) 1 J. Masern in Kindergrüppe ausgebrochen. 8 Tage vor Aufnahme Husten, 4 Tage vor Aufnahme begann li. Ohr zu laufen. Am nächsten Tage Fieber. Bei Aufnahme fehlen meningitische Zeichen, Rachen gerötet, Otitis media purulenta, Anämie. Am 9. Krankheitstag Kind plötzlich sehr verfallen. Am 12. Klt. Abducensparese li. Bei L.P. am 13. Krankheitstage Liquor dick-eitrig. Im Ausstrich reichlich Meningococcen.-M.-Serum und eine Bluttransfusion. Rasche Besserung. Am 18. Krt. Zellzahl 331. Am 21. Klt. Aufleben von Masern, obwohl Kind kurz nach Aufnahme von Masern erhielt. Verlauf komplikationslos.

6 VI d 60/ Be., In. (41) 7 Mo. 2 Tage vor Aufnahme mit Fieber, Unruhe, Berührungsempfindlichkeit erkrankt. Schwester hat zur Zeit des Krankheitsbeginnes Varicellen. Bei Aufnahme: Berührungsempfindlichkeit, Dermographismus, Rachen- und Tonsillenrötung, floride Rachitis. Liquor milchig getrübt. Druck 25 mm Hg., im Ausstrich Meningococcen. Am 5. Klt. Varicellen. Heilung.

7 VI/e/6 Mä., Wo. (49) 6 Mo. 4 Tage vor Krankheitsbeginn Pockenschutzimpfung. Keine lokale Reaktion. 4 Tage nach Impfung Wimmern, Appetitlosigkeit, Temperatur 40°. Kind kann nicht sitzen, sehr berührungsempfindlich. Aufnahme am 8. Krankheitstage: Krampfbereitschaft, Bewegungsarmut, Berührungsempfindlichkeit, Dermographismus, Stellulae palmarum, gespannte Fontanelle. Im Li-

quer Meningococcen-Heilung unter Penicillin und
Gibazol.

8 VI e/6 Wu., Ma. (43) 1 5/12 J. 3 Wochen vor Aufnahme:
Rockenschutzimpfung. 14 Tage vor Aufnahme Fieber und
Mundfäule. Bei Aufnahme schlechter Pflegezustand,
zahlreiche rote Flecken mit Kratzeffekten an den
Armen. Im weiteren Verlauf stellte sich die Erkran-
kung als M.-Meningitis mit Otitis media heraus.

9 VI e/5 Ma., Be. (47) 7 Mo. Säugling ist bei Aufnahme
berührungsempfindlich, nackensteif, Dermographismus +,
Fontanelle vorgewölbt. Liquor eitrig, im Ausstrich Men-
ingococcen. Am 4. Kit. Stühle blutig, bakteriologisch:
Bakt. enteritidis Breslau. Nach 5 Wochen geheilt ent-
lassen. Nach 12 Tagen Wiederaufnahme wegen Berührungse-
mpfindlichkeit, schrillen Schreien und Erbrechen.
Schwere Dyspepsie. Bakt. Breslau nicht nachgewiesen.
Erholung unter Eiweissmilch und Schleimkonz. 1:1.
Tage Auftreten einer Pneumonie. Nach 25 Tagen ge-
heilt entlassen.

10 VI e/16 Ba., Ka. (48) 4 Mo. Aufnahmestoff: 14 Mo. sehr
Frühgeburt mit noch sichtbaren Zeichen der Immaturität.
Dermographismus +, Liquor dick-eitrig. Im Ausstrich
massenhaft Leuko, keine Erreger. Eleudron i. v. In
Kultur des Liquors Meningococcen. Am 3. Kit. Liquor
blutig-eitrig, gegen Abend exitus letalis.

Ob das Kind Reu., Gi. zugleich mit Masern und Meningo-
coccen infiziert wurde oder ob die eventuell sehr
längere Zeit im Nasenrachenraum anwesenden Meningococ-
cen erst infolge Masernincubation in den Körper ein-
wandern konnten, ist nicht zu eruieren. Letzteres ist je-
doch wahrscheinlicher.

Bei Kind Be., Ing. wurde ebenfalls die Resistenz des
Körpers durch die Incubation eines Erregers einer Kin-

dewkrankheit herabgesetzt. Es ist in diesem Falle zu
zunehmen, dass der Meningokokkeninfekt, durch die Wunde,
weil bereits am 5. Klt. der Ausbruch der Varicellen er-
folgte.

Mö., Wo. erkrankte 4 Tage nach der Schutzimpfung
und man geht wohl nicht fehl anzunehmen, dass die
sich bereits am Zeitpunkt der Impfung in der
Ersatzung mit Keimen befand, da von einem Fehlen der
lokalen Reaktion gesprochen wird, was als Fehlen
der Reaktionskraft des Körpers gedeutet werden

Im Falle Ma., Wo. scheint eher der Schutzimpfung
bereits 3 Wochen zurücklag, vor allem die sorgfältige
Pflege, welche einwirkte auch für den Vorfall
der Mundfäule verantwortlich ist, die Infektion
nachteilig begünstigt zu haben.

Auch bei Kind Fa., Ma. haben wir zwei gleichzeitig
den Körper wirkende Leide, von denen in günstiger Re-
aktionslage des Organismus vielleicht keines zu
einer Erkrankung geführt hätte, jedoch ist die
Anwesenheit des Bakterieninfekts erst durch andere
trotzende Infektionskrankheiten (Mundfäule, Lungen-
entzündung) die baldige Niederschlagung des Infekts
mit einer Pneumonie wohl auch die Bildung eines
geschwächten Zustandes des Organismus zu erwarten.

K., Ma. ist als Frühgeburt gegen Infekte sehr empfindlich
ein ausgereiftes Kind. Es erlag die das Meningokokken-
infekt innerhalb weniger Tage und wir selbst
als Vorkrankheiten gewertet werden können eine
Otitis als Komplikation der Meningitis begreifen.

Sogenannte gripitale Infekte, die als Husten und
Schneupfen einhergingen, wurden nicht als Vorkrankheiten
gewertet, da es nicht möglich ist, zu prüfen, ob es sich
bei Beginn des katarrhalischen Infektes bereits um
eine Meningokokkeninfektion handelte. In einigen
Fällen wurde erwähnt, dass ein Älteres Kind oder ein
wachsene in der Umgebung des Kindes erkrankt seien.

Das kam öfters in dem Grippejahr 1949 vor. Es möge dahingestellt sein, ob es sich bei diesen älteren Familiengliedern um eine reine Grippe handelte oder ob ein Mischinfekt im Sinne der Leipziger Untersuchungen zustande gekommen war. In beiden Fällen wäre es möglich, dass das später mit einer Meningokokkeninfektion eingewiesene Kind entweder durch die auf seinen Organismus einwirkenden Grippeviren so geschwächt wurde, dass die vorhandenen Meningokokken ebenfalls eindringen konnten, oder dass eine gleichzeitige Infektion mit beiden Keimarten erfolgte. Eine solche Mischinfektion wurde bei 2 Kindern nachgewiesen, bei einem dritten vermutet. Diese Erkrankungen waren besonders schwer. In diesen Fällen handelte es sich um Influenzastäbchen. Zwei Fälle seien angeführt.

11 VI e/9 Be., Ka. (49) Seit 3 Wochen Husten, schleimiger Auswurf. Vor 3 Tagen Temperatur im Fieberstadium, Kopfschmerzen. Aufnahmebefund: Kind in schlechtem A.Z., Kopf in den Nacken zurückgezogen, stark angezogen, somnolent, Gesicht cyanotisch, Augen geschlossen, Berührungsempfindlichkeit++, Kernig++, Atemgeräusch rauh, Giemen über Untergrschosse hinten, Liquor eitrig. Im Ausstrich vorwiegend Loko, Gramnegative Diplococci und auf Influenza verdächtige Stäbchen. Heilung durch Streptomycin, Penicillin und Sulfonamide. (siehe Dauerschäden)

12 VI e/17 Nie., Kl.-Pe. (49) 11 Mo. Aufnahmebefund: Dystropher Säugling, keine meningitischen Zeichen, zahlreiche Lymphdrüsen geschwollen, besonders inguinal. Liquor eitrig, im Ausstrich Stäbchen. Auf Penicillin i.l. und i.m. Entfieberung am 5. Klt. In von späteren Punktionen gemachten Ausstrichen sowohl gramnegative Cocci als auch gramneg. Stäbchen. Wegen der Mischinfektion Streptomycin verabf. Kind am 20. Klt. fieberfrei. Liquor am 24. Klt. klar A.Z. deutlich besser. Am 30. Klt. Schmetter des Schä-

dels, Histidine des 1. Antikörper gegen
sche Paracet. 1. im 19. Antikörper gegen 1. im 19.
re. Paracet. 1. im 19. Antikörper gegen 1. im 19.
den 1. im 19. Antikörper gegen 1. im 19.
1. im 19. Antikörper gegen 1. im 19.
1. im 19. Antikörper gegen 1. im 19.
carditis.

Die Erkrankung des Kindes ist durch eine hohe
Temperatur und beginnende Stomatitis
zu bemerken. Im 1. im 19. Antikörper gegen 1. im 19.
einen totalen Anfall von Krämpfen und post-
ris zurück.

Die über den ganzen Körper verteilten Juckreiz
schwellenden bei 1. im 19. Antikörper gegen 1. im 19.
Generalisation der Krämpfe. Im 1. im 19.
sind im 1. im 19. Antikörper gegen 1. im 19.
der 1. im 19. Antikörper gegen 1. im 19.
gibt an. Im 1. im 19. Antikörper gegen 1. im 19.
und 1. im 19. Antikörper gegen 1. im 19.

Sind die Keime während der Inkubationszeit in die
Knochenhöhlen der Infektion übergegangen, so
sie auf dem Blutstrom im 1. im 19. Antikörper gegen 1. im 19.
bei Versuchen, die Keime zu isolieren, so
habe eine Erkränkung der Tiere, in die Keime
infektion in den Körper nicht festgestellt. Man
dass bei Einsetz der Keime in die Infektion
keit von Keimen, die in die Infektion
und Atmungsorgane die Keime, die in die
geococcus sind. 1. im 19. Antikörper gegen 1. im 19.
zündungsvergange in den Keimen und Keimen
auch in den Keimen und Keimen. Die Keime
scheinungen hatten 1. im 19. Antikörper gegen 1. im 19.
oculation unter die Körperoberfläche. Die Keime
fektionsarten konnten die Keime nachweisen, dass
die Meningococcus auf dem Keime in der Keime
gelangen.

Wir haben also am Ende der Inkubation der Keime.

sationsstadium vor uns, das bei den hier in Betracht gekommenen Meningokokkeninfektionen durch Fieber, Schnupfen, Kopfschmerzen, Halschmerzen, Gliederschmerzen, Reflexhusten, Erbrechen gekennzeichnet ist, wobei die beiden letztgenannten Symptome wahrscheinlich Zeichen auf das Stadium der Organmanifestation hinweisen. Es könnten aber auch im Körper kreisende Keime die Zentren unmittelbar angreifen. Möglicherweise Generalisation auch den Zustand der Hyperämie oder Unterimmunisierung. Es ist anzunehmen, dass in dieser Reaktionsphase zwischen Körper und Keim auch das bei allen entzündlichen Prozessen vorhandene Histamin eine bedeutende Rolle spielt. Als beweisend für das Vorhandensein von allergische Reaktionen auslösenden Histaminkörpern könnte man beispielsweise die arthritischen Beschwerden einiger Kinder auführen.

- 13 VI d/59 (40) Hu., He. 4 5/12 J. Am 11. und 12. Tage Schmerzen im re. Bein, vorwiegend in Hüfte- und Kniegelenk, stärkster Schmerz bei Innenrotation und Streckung. Wattepackung, Salbenmide. Nach 2 Tagen schmerzfrei.
- 14 VI d/7 (41) Ste., Mar. 11 J. Am 14. u. 15. Tag Schmerzen in re. Hüfte, nur geringe passive Bewegungen im Hüftgelenk möglich. Later symptomatischer Behandlung und der zu Beginn der stat. Behandlung bereits einsetzenden Salben- und Therapie Abklingen der Beschwerden.

Amerikanischerseits wurde berichtet, dass in Punktionen von in Gelenken vorhandenen Ergüssen niemals Meningokokken gefunden wurden. Durch diese Untersuchungsergebnisse dürfte eine Metastasierung in den Gelenken wohl als ausgeschlossen gelten. 25

muss aber auch die Möglichkeit einer Toxinwirkung in Betracht gezogen werden. Ein Beweis für die allergische Reaktion des gesamten menschlichen Apparates wäre das in mehreren Fällen bei septischen Erkrankungen einige Zeit vor Erscheinung der Hautblutungen auftretende diffuse Exanthem. Es ist allerdings möglich, dass zum Hervorrufen dieser Reaktion eine besonders grosse Virulenz der Erreger gehört, weil in den Krankengeschichten der ohne Hautblutungen, also ohne stürmische Generalisation verlaufenden Meningococcenkrankungen von einem vorausgehenden Exanthem berichtet wird, andererseits könnte der stürmische Verlauf der Generalisation auch von einer veränderten Reaktionslage des Körpers abhängen, was bei der Sepsis näher erörtert wird.

Die meisten an einer Meningitis erkrankten Kinder machen das Stadium der Incubation und Generalisation zu Hause durch und kommen erst bei Erscheinung der meningitischen Zeichen, also mit beginnender oder ausgeprägter Organmanifestation in den Klinik zur stat. Behandlung. Es ist auch möglich, dass bei einem Verlauf wie dem in folgender Krankengeschichte geschilderten nur an eine schwere Schädigung gedacht wird und dass diese unter der heute allgemein gehandhabten Sulfonamidtherapie zur Heilung käme, ohne die meningitischen Symptome in Erscheinung treten zu lassen.

15 VI e/2 (45) Mau., Ba. 1 3/12 J. 3 Tage vor Aufnahme Fieber und Erbrechen, zunehmende Müdigkeit. Aufnahmebefund: berührungsempfindliches, leicht somnolentes Kleinkind, Fontanella: gering vorgewölbt, Dermographismus +, Stellulae plannae keine Nackensteife, gelb-grüne zäh-schleimige Sekretion aus der Nase, Tachycardie: über beiden Lungen grob bis mittelblasige Rgs. Liquor dick-eitrig, im Ausstrich massenhaft Leuko, vereinzelt

to granulograt. Lymphocytosen. Temperatur auf
Krit. auf 37° steigt, sonst in Berlin in 10. Tag.
Nach dreitägiger Glibenclortherapie stillgelegt.
Schwinder. Bei geringfügiger Erleichterung.
Heilung nach 14 Tagen statt. Behandlung.

Als Beispiel eines komplizierten Verlaufes einer Meningoencephalitis sei die Erkrankung von Dr. H. L. angeführt.

16 VI 6/22 (39) Ga., Kr. 3 7/12 J. 2 Tage vor Auf-
nahme Fieber, $40,5^{\circ}$. Am nächsten Tage Coma-
turabfall, Erbrechen, Halssteifheit, Kopf-
schmerzen. Etwas in der Nacht. Keine Urtergen. Keine
Zellen ruhig im Netz. Keine Urtergen. Keine
Halssteifheit +. Darmtraktus +. Keine
Grüschwellungen. Entzündung des Stern. eitrige
Liquor trüb. In Anstrich Meningococcus. Tem-
peratur 40. Lunge 1. u. 2. Frontalteil per. 1. u. 2. u.
Sinken der Zellen auf 27.5. Langsame Er-
holung. Am 6. Kr. Temperatur normal. 1. u. 2. u.
naturanstieg. Gehirnarterien. Gehirnt. eitrige.

Diese Meningitis war nach der Generalisation eine
eine Organinfektion, wie die Langfortschreitungen
am Sternocleus und der Liquorkeimung ge-
weisen. unter Serum- und Salicyltherapie zur
Ausheilung.

Im folgenden Teil seien drei Fälle Meningitis-
der Meningitis besprochen.

17 VI 6/2 (44) Ga., Kr. 3 6/12 J. 4 Tage vor Auf-
nahme Erbrechen, Müdigkeit und Kopfschmerzen.
Aufnahmebefund: elender Junge in schlechter A. T.
Kopf in den Nacken gebeugt, stark berührungse-
mpfindlich, Kernig +, Halssteifheit +, Nacken
und Tonsillen gerötet. Liquor eitrig, Druck 40 mm

Ag. Eizellproben +, im Ausstrich Leukozytengramm +. Dipteryden und Stäbchen (Meningokokken?) bis zum 4. Lit. fändion, Temperatur 36.6. Klt. schfebril. 3. 5. gepusert. Am 7. Klt. Temperatur 40°. Wiedertraten der meningitischen Symptome, Erweit. Klindion, Blutfärbung, Abklingen der meningit. Zeichen. Zwei Tage nach Absetzen des Klindion erneut Fieberanstieg, Verstärkung der meningit. Symptome, Abklingen eines Tremors, Pupillen weit, reagieren aber auf Lichtreizfall, Ataria, Liquor wieder eitrig, am 13. im Hg. im Ausstrich erneut Meningokokken. Am 14. Klt. fällt Kulturendlichkeit gegen Sulfonamide auf. Färbung mit Kurzwelle behandelt. 3 Tage nach Zetzung der Sulfonamidgabe am 22. Klt. Temperatur normal. Wiederkehr der meningit. Symptome, Liquor eitrig, Bakterien diesmal nicht nachweisbar. Auf Klindion und Bluttransfusionen endgültig Reservierung. Bei Entlassung Restitutio ad integrum bis auf völligen Gehörverlust.

Die geringe Anzahl der Erreger im Liquor lässt vermuten, dass es dem Körper nicht gelang, die Keime nach den Meningen abzuwehren. Mit Hilfe des Klindion wurde die Infektion jedoch beherrscht. Besonders eindrucksvoll ist der regelmäßige Rückfall der Erkrankung zwei bis drei Tage nach Abzug der Sulfonamide. Es ist anzunehmen, dass an irgendeiner Stelle des Körpers eine Metastasierung stattfand, und von dort aus immer wieder eine Streuung einsetzte. Da das Kind nach dem zweiten Recidiv taub war, könnte dieser Hard vielleicht im Mittel- oder Innenohr gelegen haben (Es wurde bei einigen Autopsien Otitiden festgestellt, die sich im Verlaufe der Krankheit durch keinerlei Beschwerden bemerkbar machten. Näheres bei Otitis als Organmetastase.) Auf einen den Meningen nahen Streuungsherd könnte man auch auf Grund

der bei jedem Recidiv noch weiter erhöhten Zellzahl schliessen. Erst die Kombination Sulfonamide und Bluttransfusionen führte zur Heilung. (Kind wurde nachuntersucht, Bericht unten)

18 VI d/34 Moll., Ge. (40) 9 1/2 Mo. Einen Tag vor Aufnahme Fieber und Blässe, schmerzhaftes Schwellung am li. Fuss, die stärker wurde. Aufnahmebefund: leicht somnolentes, berührungsempfindliches Kind, am ganzen Körper flüchtige rote Flecken, Dermographismus +++, Stellulae palmarum, li. Fussrücken blaurot geschwollen, Fontanelle vorgewölbt, serös-schleimige Sekretion aus der Nase, Opisthotonus, Nackensteifigkeit angedeutet, Kernig +, über beiden Lungen hinten vereinzelt bronchitische Geräusche, Lippen borkig, Zunge belegt, Tonsillen und Rachen gerötet, Liquor dick-eitrig, im Ausstrich vereinzelt gramneg. Diplococcen. Unter Sulfapyridin Abnahme der meningitischen Symptome und der Schwellung des Fusses. Am 4. Tag nach Absetzen des Mittels Temperatur 40° Stärkerwerden der meningit. Symptome. Unter Cibazol Abklingen des Recidivs, Kind stellt sich im Bettchen auf. 5 Tage nach Einstellung der Sulfonamidgaben wieder Temperaturanstieg, Erhöhung der Zellzahl im Liquor. Vor diesem Recidiv flüchtiges erythemartiges Exanthem. Auf Bluttransfusionen und Albucid Heilung.

Hier taucht unwillkürlich die Frage auf: "Ist der Schwellung des Fusses eventuell eine Verletzung vorausgegangen?" Es wird allerdings weder in der Anamnese noch im Aufnahmebefund von einer Narbe berichtet. Die Möglichkeit des Eindringens der Keime durch eine Kratzwunde, die beim Eintritt der Krankheitszeichen bereits verheilt war, bestünde

aber auch. Ob die im Aufnahmebericht erwähnten roten Flecken mit dem in einigen Fällen von Monoglossocensepsia beobachteten Exanthem identisch sind, kann nicht entschieden werden. Im Gegensatz zu dem vorher angeführten Fall können wir hier mit hoher Sicherheit die Schwellung am Fuss als Strangulationsherd betrachten. Vor dem schwersten Kessit war der Fuss noch nicht völlig abgeschwollen. Das Kind stellte sich aber bereits auf und bewegte den Fuss, was eine Bakteriensuschwemmung natürlich begünstigte. Durch Cibazolgaben wurde diese Infektion schliesslich beherrscht.

19 VI d/11 (36) Sei., An. 2 1/12 J. Am 2. V. Erbrechen, Augenverdrehen, Temperatur 40° , Krämpfe mit Händen und Füssen. Wurde als Bronchitis behandelt. Temperatur bis Mitte Mai um 39° , von Mitte bis Ende Mai zwischen 37° und 38° , keine Krämpfe, jedoch ab und zu schrillen Aufschreien. Von Anfang Juni bis 13. VI. Temperatur normal, vereinzelt Erbrechen. Am 13. VI. Temperatur 38° , Erbrechen und Krämpfe. L. P. durch Hausarzt. Liquor an Behringinstitut eingesandt. Pandy, Nonne, Apelt positiv, wenig Zellen, grampositive Diplococcen.

Aufnahmebefund 22. VI.: somnolentes Kind, starke Berührungsempfindlichkeit, Dermographismus ++, Stellulae palmarum, cervicale und submaxillare Lymphdrüsen linsen- bis erbsengross, hintere Rachenwand und Tonsillen stark gerötet, Puls frequent, Herz und Lunge o. path. Befund, Leber und Milz nicht vergrössert. Liquor trüb, in beiden ersten Liquorproben keine Bakterien. Am 3. Klt. gramnegat. Diplococcen nachgewiesen, Zellzahl 2150. Nach Bluttransfusion am 3. Klt. Temperatur 40° . Kind schlief viel, keine Krämpfe. An zwei folgenden Tagen Temperatur subfebril, am dritten wieder auf 39° angestiegen. Zellzahl

300, Meningococcen noch nachweisbar. Bluttransfusion am 8. Klt. gut vertragen, A. 2. gebessert. Am 15. Klt. Temperatur 40°, Krampfbereitschaft, feinschlägiger Tremor der oberen und extremen Streckstellung der unteren Extremitäten, Stellulus palmarum, Schmeck- und Kaubewegungen, Nackensteifigkeit, Pupillen weit, Somnolenz, Kreislaufschwäche. Bei Bluttransfusion am 16. Klt. schockartiger Kollaps. Auf Analeptica Erholung. Am 17. Klt. an Stamm und an den Extremitäten petechiale Blutungen. Beim Öffnen der Augen kursschlägiger Nystagmus, Im Laufe des Tages Auftreten von Krämpfen. Liquor weisslich getrübt, im Ausstrich reichlich Meningococcen. Es wurden zweitägig 20 ccm Blut i. m. gegeben. Bis zum 20. Klt. langsame Besserung des Allgemeinbefindens, Sinken der Zellzahl, im Ausstrich noch vereinzelt Erreger. Die nur 8 600 betragende Leukocytenzahl liess sich auch durch Terpinabzessbehandlung nicht erhöhen. Leuko sanken auf 4 600 ab. Am 32. Klt. Nachlassen der Nackensteife und Berührungsempfindlichkeit; am 35. Klt. kernig. Ophthalmologische Untersuchung am 39. Klt. ergab Stauungspapille bds. Nach wiederholten Entlastungspunctionen Rückgang der Stauungspapille. Liquor klar, keine Erreger, 4 Zellen. Bei Entlassung Bewegungen unsicher, Lichtquelle wird nicht fixiert, Kopf kann nur mit Mühe aufrecht gehalten werden, Spasmen in den unteren Extremitäten, Ausfall des Sehvermögens? Nachuntersuchung 1/2 Jahr später: Beim Gehen nur noch leichte Handführung notwendig, psychisch rege, Fixieren mit den Augen möglich, Bewegungen zielsicher. Am Augenbilde grund geringgradige Abblassung der Papillen. Restitutio ad integrum.

Wahrscheinlich handelte es sich bei diesem Kinde bereits 5 Wochen vor der stat. Aufnahme um

einen Meningococceninfekt. Für die vom Hausarzt angenommene schwere Bronchitis spricht nicht allzu viel. Die lange erhöhten Temperaturen, die gellenden Schreie des Kindes, das "Verdröhen der Augen" und die Krampfanfälle sprechen für eine Meningitis. Dass in einem 2 Tage alten Liquor keine Meningococcen gefunden wurden ist kein stichhaltiger Gegenbeweis, da Meningococcen gegen Abkühlung sehr empfindlich sind und rasch zugrunde gehen. Die im Kopfreich vergrösserten cervicalen und submaxillären Lymphdrüsen und die stark geröteten Tonsillen weisen auf die Anwesenheit von Keimen in dieser Gegend hin. Die über Wochen anhaltenden Temperaturerhöhungen dürften als Zeichen einer schleichenden Infektion, ähnlich der Sepsis lenta gedeutet werden können. Anscheinend war der Rachenring in diesem Falle Eintrittspforte und Sepsisherd. Für eine mangelhafte Organmanifestation spricht das Fehlen von Keimen in den ersten in der Klinik untersuchten Liquorproben. Die Herabsetzung der Reaktionskraft des Körpers wird durch das Fehlen der Leukocytose gekennzeichnet. Erst nach mehreren Bluttransfusionen reagiert der Körper heftiger auf die Anwesenheit der Keime, was durch Temperaturerhöhungen bis 40° gekennzeichnet wird. Noch beherrscht der Körper aber die Infektion nicht, denn im Liquor werden trotz nur noch geringer Erhöhung der Zellzahl immer wieder Meningococcen nachgewiesen. Während einer Bluttransfusion in der 3. Woche Auftreten eines schweren Kollapses und Temperaturanstieg auf 40° . Die am Tage nach der Transfusion auftretenden petechialen Hautblutungen beweisen nun deutlich, dass wir ein septisches Krankheitsbild vor uns haben. Wir finden bei diesem Kinde drei Voraussetzungen, die für das Zustandekommen einer Sepsis gefordert werden: 1. Eine Unterfunktion des Abwehrsystems des Körpers, 2. die Sensibilisierung des Organismus infolge einer vorausgehenden Erkrankung

durch den gleichen Erreger und 3. den Rachenring als Eintrittspforte und Sepsisherd.

20 VI e/20 (48) Wer., Wo. 4 1/2 Mo. Kind 3 Tage vor Aufnahme erkrankt, trank nicht, schrie jämmerlich, hohes Fieber. Am nächsten Tag Krampfanfall. Tag vor der Aufnahme Kreislaufkollaps. Aufnahmebefund: Säugling grau-blass, subtoxisch. Strabismus convergens, periorale Cyanose, schlaffer Turgor, keine Hautblutungen, Atmung beschleunigt. Keine Schmerzensäußerung bei Injektion. Liquor trüb, Druck nicht erhöht, im Ausstrich gramnegat. Diplococcen. Penicillin 1 i. 8 Stunden nach Aufnahme exitus unter tonisch-klonischen Krämpfen.

Sektion: eitrige Meningitis, besonders der Hirnbasis, feintropfige Leberverfettung.

Handelt es sich hier um eine toxische Form der Meningococcenerkrankung? Die tiefe Benommenheit des Säuglings, er reagierte nicht einmal auf eine Injektion, und die feintropfige Leberverfettung sprechen dafür.

Wie aus den 6 unter Meningitis angeführten Krankenberichten hervorgeht, ist der Krankheitsverlauf sehr variant. Als wichtigsten Faktor beim Zustandekommen dieser verschiedenen Verlaufsformen lernten wir die Reaktionslage des Körpers kennen. Im Beginn der Erkrankungen standen bei fast allen Kindern die auch die Erkältungskrankheiten und andere Infekte begleitenden Beschwerden: Fieber, Kopf- Hals- und Gliederschmerzen. Ohrenscherzen gehören nicht selten zu den ersten Symptomen der M.-Infektion. Ein Kind zeigte im Beginn der Erkrankung ein deutliches Zustandsbild. Ob das bei vielen Kindern auftretende Erbrechen als die Folge eines schweren Infektes oder als das erste Zeichen einer beginnenden in-

tracraniellen Druckerhöhung zu deuten ist, kann nicht sicher entschieden werden. Zu diesen Initialsymptomen treten dann früher oder später die für eine M.-Erkrankung charakteristischen meningitischen Zeichen: Nackensteife, Opisthotonus, Kahnbauch, Stellulae palmarum etc. Je nach der Abwehrkraft des Körpers bietet sich uns nun ein verschieden schweres Krankheitsbild. (Es sei jedoch auch an die Möglichkeit der Mitwirkung der Virulenz der Keime gedacht.) Kind 15, dessen Erkrankung im Verlaufsbericht als abortive Form von M.-Meningitis bezeichnet wurde, wies so geringe meningitische Symptome auf, dass man, wenn nicht das Ergebnis der L.F. vorläge, eher eine starke Erkältung vermuten könnte. Da die Temperatur während des klinischen Aufenthaltes kaum über der Norm lag, kann angenommen werden, dass der Heilungsprocess schon vor der stat. Aufnahme vom Körper eingeleitet war. Kind 16 zeigte in der Klinik ebenfalls nur noch das Bild bereits erfolgter Organmanifestation. Die ärztliche Hilfe wird, da die ersten Symptome von den Eltern meistens als Beginn einer Erkältung angesehen werden, in der Mehrzahl der Fälle dann in Anspruch genommen, wenn die Temperatur ungewöhnlich hoch steigt und meningitische Zeichen in Form von Berührungsempfindlichkeit und Krämpfen auftreten. So gelangen M.-Infekte, die normal über eine Meningitis zur Heilung kommen, selten im Generalisationsstadium in ärztliche Behandlung. Von den drei Patienten, die recidivierende M.-Erkrankungen durchmachten, wies das Kind 19 deutlich eine mangelhafte Organmanifestation auf, was in diesem Falle als Folge der geringen Abwehrreaktion des Körpers gedeutet wird. Der intakte Abwehrmechanismus fixiert die Keime in den Meningen, und das Krankheitsbild wird dann von den Symptomen der Meningitis beherrscht. Als meningitische Symptome zeigten die zur Beobachtung gelangten Patienten von der leichten Nackensteifig-

keit mit geringen Bakterien bis zum schweren
Opisthotonus mit Fieber, Bewußtsein und
Wasserkopf und schweren schließlichen Krämpfen.
Die verschiedenen Krankheitsbilder des Liquors
da meist getrübt bis dick-schleimig, gelblich, mit
Leukocytenreichthum, die stärkere oder
schwächere Trübung hängt von der Reaktion des
Leukocytenreiches ab, aber von der Menge
oder Virulenz der Erreger abhängt, kann aus den
Krankheitsberichten nicht erschlossen werden, ob diese
eitrigen Liquor wurden jedoch in mehreren Fällen
nur vereinzelt Leukocyten gefunden und in
leicht getrübtet meistens mangelhaft waren. (Es
wäre allerdings auch möglich, dass in eitrigen
Liquor die Leukozyten bereits
zerstört wurden, vor wie in den einzelnen Fällen
eine primäre Inaffizienz des Leukocyten-
Systems oder eine Schädigung desselben durch ein
toxikotisches Toxin seine Erklärung verleiht,
nicht mit in Betracht zu ziehen. Die Kinder 17
und 18 befinden sich noch während der eitrigen
Behandlung in einer generalisierten Generalisation,
die bei ihnen, wie bereits oben erwähnt, vermehrt
durch fortgesetzte Störung des Metabolismus ent-
stande sein kann. Diese beiden erst nach längerer Zeit
unter intensiver Behandlung aus, weil die Bakterien
dort vor Medikamenten geschützt sind als in den
von Liquor umspülten Meninges oder gar im strö-
menden Blute, wo sie von Pharmaka aus entfernt wer-
den können. Also nur in abnorm verlaufenden Fällen
stehen wir während der stat. Beobachtung dem Ge-
neralisationstadium gegenüber, das sonst schon
zur Zeit der Aufnahme zum größten Teil vorüber
ist. Zu diesen als abnorm bezeichneten Verläufen
ist auch die M.-Sepsis zu zählen. Halten sich die
Keime sehr lange im Körper auf gelangt eine Zeit
zu Zeit ein neuer Schub ins Blut, so reagiert der
Organismus, wie Kind 19 zeigt, nach längerer Krank-

heitsdauer und Änderung der Reaktionslage an auf diese Störungen. Ob eine Meningitis, wie sie bei Kind 20 auftrat, als feuchter Meningitis, als toxische Form oder als Sepsis aufzufassen ist, kann wohl am Krankenbett ebenso schwer unterschieden werden wie an Hand von Krankenberichten. Da die beiden Erscheinungsformen die Meningitis und die M.-Sepsis nebeneinander vorkommen und manchmal, wie im Falle Sei., an, eine der anderen folgt und die als Sepsis beginnende M.-Erkrankung in der weitaus größten Zahl der Fälle über eine Meningitis zur Heilung gelangt, ist es nicht möglich, völlig klar das eine Bild vor dem anderen zu trennen. Man kann in prakt. Hinsicht von einem vorwiegend meningitischen oder vorwiegend septischen Verlauf sprechen. Es ist wichtig festzustellen, dass, wie aus dem Krankenbericht von Kind 21, bei dem zum Schluss eine Sepsis auftrat, aus demjenigen des Kindes 71, vorwiegend septisch ist, die M.-Erkrankung usw. schwerer ist und größere Schäden hinterlässt, je später die Heilung einsetzt.

Sicher spielt auch die Virulenz der Erreger im Ablauf der Erkrankung eine Rolle, was aus den leichteren oder schwereren Verlauf einzelner Epidemien ersehen werden kann. Es werden von einigen Verfassern verschiedene Meningococcen-typen unterschieden, deren Pathogenität ungleich gross ist. Allerdings müsste man uns darüber bei den feststehenden Erkrankungen Genaueres sagen zu können, die gefundenen Keime züchten und Tierversuche machen.

Als Meningococcensepsis wurden alle mit Hautblutungen einhergehenden Meningococcenerkrankungen bezeichnet. Vor den näheren Erörterungen dieses Krankheitsbildes seien einige Krankenberichte mitgeteilt, die eventuell über das Zustandekommen Aufklärung geben können, und einige, die für das Ver-

lauf dieser Meningococcenerkrankung charakteristisch sind.

21 VI d/5 (40) Stru., Hei. 12 J. 3 Wochen vor Aufnahme erkrankt, Temperatur 38-39°, Schwindel, Ohrenscherzen li. Nach einer Woche künstlichen Krankenlagers fieberfrei, wegen Schwindel und Abgeschlagenheit nicht aufgestanden. Einen Tag vor Aufnahme Erbrechen, Krampfanfall. Aufnahmebefund: liegt in tiefster Bewusstlosigkeit, Augen weit geöffnet, Pupillen fast lichtstarr, alle meningealen Symptome ++, am Rumpf vereinzelte petechiale Blutungen, von denen einige erhoben sind und einen roten Hof zeigen, am Stamm mehrfach kommissures und verstreute kleine Erythemen, multiple Lymphdrüsenanschwellungen am ganzen Körper. Puls frequent, genügend gefüllt, Herz und Lunge o.B. Liquor trüb, 66 cm absinkbar, Serum i.B. Im Sediment des Liquors hier 5000 Zellen, Meningococcen nachgewiesen. Am nächsten Tage unter Unregelmässiger und flacher werdender Atmung Exitus letalis. Sektion: Schwere eitrige Meningitis der Basis und Convexität.

Temperatur, Schwindel und Ohrenscherzen lassen mit ziemlicher Sicherheit vermuten, dass die Meningococcenerkrankung bereits seit 3 Wochen bestand. Auch das fieberfreie Intervall weist trotz schon der noch bestehenden Infektion auf, so solange dem Körper jedoch nicht, die Kräfte erschöpfen zu machen und so folgte dem Stadium der Hypergie nach etwa 14 Tagen bei einer neuen Erkrankung eine septische Erkrankung mit Erythemen und petechialen Blutungen.

22 und 23 VI d/65 u. VI d/66 Fried. Cl. 11 Mo.;
Fried. Si. 3 J. Geschwister; Krankheitsbeginn
bei dem Säugling 2 Tage vor stat. Aufnahme, am
nächsten Tage am Stamm und den Extremitäten
zahlreiche linsengrosse blass-braunrote Fleck-
chen, die nachmittags schwanden. Kurz vor Auf-
nahme Krämpfe. Bei Aufnahme meningitische Symp-
tome ++, keine Hautblutungen, Tonsillen und
Rachen hochrot, Liquor trüb, im Ausstrich Menin-
gococcen. Heilungsbeginn am 7. Klt. Nach 11 Klt.
mening. Symptome völlig geschwunden.
Ältere Schwester 1 1/2 Tage später mit Kopf-
schmerzen, motorischer Unruhe, Bewusstseinsstör-
ungen und Temperatur um 39° erkrankt. Gegen
Mittag des Aufnahmetages Sehstörungen, Auftre-
ten von tonisch-klonischen Krämpfen. Aufnahme-
befund: Kind leicht benommen, meningitische
Symptome ++, am Thorax petechiale Blutungen,
Tachycardie. Liquor trüb, im Ausstrich Meningo-
coccen. Bereits am 3. Klt. Sensorium frei, Liquor
klar nach Sulfonamidtherapie.

Der Vater der Kinder war 8 Tage vor der Aufnahme
von der Westfront zurückgekehrt. Anscheinend war er
der Bakterienträger. Man kann wohl mit Sicherheit
annehmen, dass die Kinder zum gleichen Zeitpunkt
und mit demselben Erreger infiziert wurden. So be-
stätigt der um 1 1/2 Tage früher eingetretene
Krankheitsausbruch bei dem Säugling geradezu
frappierend die von Köring aufgestellte Theorie,
dass die Entstehung einer Krankheit sowohl von der
Virulenz der Bakterien als auch von der Grösse der
Resistenzkraft des Körpers abhängig ist. Bei dem
Säugling könnte es wegen Fehlens der Allergisierung
nicht zum Auftreten von Hautblutungen gekommen
sein. Die drei älteren Geschwister aber scheinen
bereits mit Meningococcen in Berührung gekommen

befund: geringer Meningismus, subconjunctivale Blutung i. r. Auge, am ganzen Körper stecknadelkopf-linsen grosse Hautblutungen, Tonsillen gerötet. Im Liquor 35 Zellen, keine Erreger. Unter Sulfonamiden am 2 Klt. Entfieberung.

Während der 10 Tage dauernden Erkrankung gelang es im Falle des Kindes 24 dem Körper nicht, die Keime nach den Meningen abzudrängen, sodass es schliesslich zu einer septischen Erkrankung mit Hautblutungen kam, in denen sich Erreger nachweisen liessen.

Kind 25 zeigt ausser mit Eiter gefüllten Bläschen in der Leistenbeuge und durch mangelhafte Pflege verursachte Maceration der Gesässhaut noch mit Schorf bedeckte Impfpusteln. Es könnte hier also eine Hyperergie durch die bereits auf den Körper einwirkenden Staphylo- oder Streptococcen und die Impfvaccine vorliegen.

Bei Kind 26, das plötzlich und mit hohem Temperaturanstieg erkrankte, scheint eine Allergisierung vorzuliegen. Das auf Sulfonamide so rasch erfolgende Absinken der Temperatur kann ebenfalls als Folge der bereits durch die Antikörper vor Beginn der Therapie stattgefundenen Schädigung der Keime angesehen werden.

Sepsis und Meningitis

27 VI e 10/ (49) Frau, 30. Jahre. Vor 4 Wochen erstmals Kopfschmerzen, ab und zu Erbrechen. Mutter führte es auf Vassertrinken und Eisessen des Jungen zurück. Am Tag vor Aufnahme um elfe Stachelbeeren, Kirschen und Erdbeeren gegessen. In der Nacht häufiges Erbrechen. Am Morgen des Aufnahmetages Kopfschmerzen, Erbrechen; Kind war ausser Bett. Gegen 15 Uhr Schüttelfrost, Temperatur $39,5^{\circ}$. Nackensteife, Benommenheit. Aufnahmebefund: fast moribunder Junge, Kopf leicht zurückgebogen, Augen geschlossen, ist ansprechbar, aber desorientiert. In der Haut, am Rücken, beiden Unterarmen und Hals hirse Korn- bis linsengrosse unregelmässig begrenzte, blau-rote Flecken, die sich nicht wegdrücken lassen. Ein annähernd 10-pfennigstückgrosser Herd über dem rechten Darmbeinkamm ist deutlich über dem Nabelniveau und als typische Embolie anzusprechen. BGR nicht ausföhrbar, sehr starke Nackensteifigkeit Kernig +++. Herzöne leise, etwas unrein. Schlagfolge regelmässig. Puls klein, weich und unterdrückbar. RR 95/50. Lunge ohne path. Befund, Milz und Leber nicht vergrössert. Nacken reizlos. Zunge feucht. Liquor bei der ersten L.P. getrübt, bei 2. L.P. 15 Stunden später klar. Erreger im Liquor nicht nachgewiesen. Auf Penicillin 2 mal 30 000 000 i.v. und 3 stündlich 30 000 000 i.v. besserte sich auch der Kreislauf. Am 3. Klt. Liquor völlig klar, noch geringer Meningismus und mässiger Kopfschmerz, Hautembolien als kleine bräunliche Flecken sichtbar. Nach 12 Tagen geheilt entlassen.

Schwelte die M.-Infektion schon seit 4 Wochen?

Gegen einen frischen Infekt spricht der reizbare Rachen, der bei allen beginnenden Meningokokkenkrankungen gerötet gefunden wird. Wahrscheinlich befand sich der Körper bis zu dem Zeitpunkt, da der Junge das unverdauliche Cost genoss und sich damit eine Gastro-enteritis zuzog, mit den Keimen in einem Gleichgewicht. Durch die lange Anwesenheit der Erreger im Körper war ein Zustand der Überimmunisierung eingetreten, sodass es nach der Abschwächung der Abwehrkraft des Organismus zu einer septischen Erkrankung kam. Die Organmanifestation erfolgte erst nach Einsetzen der Parainfluenza.

Als Sepsis mit Meningitis sei das Kind VI., Nr. noch angeführt, da es eines der jüngsten an einer Sepsis erkrankten Kinder war.

28 VI e 5 (46) 7 Wochen. VI., Jr. Einen Tag vor Aufnahme Temperatur $39,5^{\circ}$. Aufnahmebefund: stark berührungsempfindlicher Säugling. Tagger schmerzhaft. Fettpolster spärlich, sichtbare Schleimhäute gut durchblutet. Am 11. Unterschenkel unterhalb des Fibulaköpfchens dunkelbläulicher, als Infiltrat fühlbarer Fleck. An beiden Unterschenkeln zahlreiche annähernd stecknadelspitzen-große Fleckchen, die aber nicht als Infiltrate palpabel sind, subconjunctivale Blutung im rechten Auge und Lunge o.p.B. Rachenring leicht gerötet. Wegen Misslingens der L.P. Suboccipitalpunktion. Liquor dick-eitrig, Meningokokken nachgewiesen. Gegen Abend des 1. Klt. Fontanelle kugelförmig vorgewölbt, Entlastungspunktion. Mit Pilocarpin i.v. und per os am 4. Klt. Rückgang der meningitischen Zeichen, Ablassen der Fontanelle und Besserung des A.Z. Im Ausstrich des Liquors vom 9. Klt. wurden noch gramnegative Diplokokken

und Cereale in Keimform gegeben. Ein gleiches
Zustand am 4. XII. wurde als "Veranlassung" ge-
deutet. Die Temperatur fiel erst am 16. XII. vor
Norm ab. Auch die Leukozytose ging zurück. Nach
am 11. XII. bereits Remission. In der Nacht vor
Entlassung zu Intervallen traten eine be-
schleunigte Atmung der 36. 12 und bronchitische
Ausschlag vermehrter Husten. Nach dem
durch das Röntgenogramm nicht bestätigt. Am
64 tägiger Behandlung wurde der Säugling ge-
heilt entlassen.

Es handelt sich bei diesen Fälle zweifellos um
eine Infektion mit Meningokokken. Im Liquor
findet man aber neben Diplokokken rasch andere
Coccen. Warum diese keine nun zusammen mit den Men-
ningokokken Ursache der septischen Erscheinungen?
Hatten sie bereits den Körper sensibilisiert? War-
um war schon am 11. XII. zwischen 2 und 11. XII.
kein Blutbild eine Leukopenie von 227 (normal
von 4000-5000), da diese doch so allgemein nur
bei eitrigen Reaktionen aufzutreten pflegt?

Als Beispiele einer Sepsis mit schwerer Meningitis
sehen die Krankenberichte von Lohr, Ko. und W. In.
angeführt.

VI & 57 (40) 20 Ko. 3 Tage vor Aufnahme un-
kränkelnd ersten Tag Malignität, Erbrechen
Temperatur 40°. Folgende Nacht ruhr, morgens
Temperatur 37,5°. In der Nacht vor Aufnahme
Nackensteifigkeit.

Aufnahmefähigkeit: mangelndes Kind, schwere meningi-
tische Symptome, petechiale Ausschläge am
Hals und Extremitäten, Puls beschleunigt, roter

und Schläfenlappen und dem li. Stirnlappen.
 Entzündung der pialen Venen, Thrombose aller
 Sinus. Otitis media purulenta beiderseits.
 Meningitis re. Kleine Blutung in das linke
 Hirnhirn.

Autopsie: Im unterbucht Schnitt kleine
 Blutungen in das Hirngewebe.

Fibrinöse hyaline und Kalk-Cylinder in der li.
 Niere.

Der Fall begann mit einem M.-Sepsis eingeliefert.
 Am 1. April war eine Ergussmanifestation bereits er-
 scheint. In den ersten Tagen die Schwellungen der inguinalen
 Lymphknoten mit einer noch bestehenden Meningococcen-
 Infektion. Die einsetzende Therapie eine so
 starke Wirkung auf die Meningococcen, dass diese
 abgetötet wurden und die Thrombozytose der ver-
 schiedenen Venen und die Entzündung aus dem Hirn-
 gewebe verschwand. Die Blutung erfolgte erst
 nach der Entzündung und dem Beginn der Sulfo-
 pyridintherapie, denn der erste Liquor war nur ei-
 trig.

(2. April 1935) M.H.L., Brigg. 4 1/2 Jahre. Eine
 Woche vor dem ersten Erkrankungsbeginn Urin-
 sedimente, die Entzündung der Nieren in die Klinik
 brachten. Urin: Hämaturie, Leukozytose 10⁶. Kind
 zeigte Kopf-, Hals-, Rücken- und Leibes-
 schmerzen. In den ersten 10 Tagen, Erbrechen, in
 Folge der typischen kurzfristigen Besserung. Danach
 wieder Erbrechen, das Auftreten eines "aus-
 gewachsenen" Kindes, das in Laufe des
 1. Monats wieder verschwand.
 Symptome: Hämaturie, Leukozytose, Rückensteifigkeit, Kopf-
 schmerzen, Erbrechen, klarer Harn, Liquor trüb.

im Ausstrich Meningococcus, Leuko- und Erythrocyten.
Ery. Im Urin massenhaft Ery. RN 96 mg%, RN 110/50.
keine Ödeme. Therapie: Obstige, salzfrei, Kasein,
Penicillin, Bactinal.

Wasser- und Konzentrationsversuch vor Entlassung
zeigte gute Ausscheidung, normale Verdünnung, max.
maximale Konzentration von 1035, RN 34 mg%.

Handelt es sich hier um eine Nierenerkrankung in-
folge Meningococcämie i.S. einer Herdnephritis oder
ist sie toxisch bedingt? Nicht nur im Urin, auch im
Liquor fanden sich Erythrocyten. Ist der erhöhte RN
hier nur die Folge der Nierenerkrankung oder auch
einer gleichzeitigen Leberparenchymschädigung i.S.
eines hepato-renalen Syndroms?

33 VI e 4 Ho., Ro. (43) 2 1/2 Jahre. Aufnahme-
fund: zahlreiche Kinder, die grössere Eitropen-
tritte unter die Haut aufwiesen, stechnadel-
kopf- bis linsengrosse, z.T. blaue Flecken am
ganzen Körper, an der re. Fuss-Sohle grössere
Flächen. An Zehen und in Falten der Sohle der
Füsse Reste von Scabieseffloreszenzen. Rechte
Ferse, re. Wade, und drei Stellen im Rücken zeig-
ten unregelmässig begrenzte, 50-pfennigstück-
grosse rote Flecken mit zentraler Hautblutung,
die blauschwarz verfärbt waren. Keine Trübung
des Sensoriums, Atmung forciert, Herzaktion be-
schleunigt. Liquor trüb, im Ausstrich Meningococ-
cen. Heilung unter Cibazol.

34 VI e 5 (48) We., Gü. 1 1/2 Jahre. 12 Stunden vor
Aufnahme erkrankt, kam moribund mit grossen in-
travitalen Totenflecken ohne meningitische Sym-
ptome mit extremer Kreislaufschwäche zur Aufn.

nahme. Trotz C₁ und reichlich Kreislaufmitteln trat der Exitus letalis eine knappe Stunde nach der Aufnahme ein.

Sektion: Eitrige Leptomeningitis und Thymushyperplasie, Hyperplasie des gesamten lymphatischen Apparates.

Beide Kinder zeigen grössere Blutungen unter die Haut. Ob es sich jedoch trotz des fehlenden Nierenbefundes bei Kind 34 auch um die später unter Waterhouse-Friderichsen-Syndrom besprochene Verlaufsform der M.-Sepsis handelt, kann nicht entschieden werden, weil eine Inspektion der Nieren nicht stattfand. Allerdings sind Kinder mit Thymushyperplasie oft auch kreislaufschwach und Infektionen gegenüber wenig resistent.

Der nachstehende Krankenbericht schildert den Verlauf der Erkrankung eines Kindes, das die gleiche Anamnese wie die mit Wa. P. ad exitum gekommenen Kinder aufweist und mit intravitalem Totenflecken zur Aufnahme kam. Auf sehr hohe Dosen Desoxykorticosteron erholt sich das Kind.

VI r 6 (47) Mar., Jähr. 2 1/2 Jahre alt. 21 Stunden vor der Aufnahme aus voller Gesundheit erkrankt, Temperatur 39,8°, die in der Nacht auf 40,7° stieg. Auf Gelände Temperatur 38,5°. 12 Stunden nach Erkrankungsbeginn Verfärbung der Haut, Auftreten von Hautblutungen, die rasch zahlreicher wurden. Aufnahmebefund: intravitale Totenflecken an den abhängigen Partien, über den ganzen Körper verteilt stecknadelkopflinsengroße Hautblutungen. Kind war fast pulslös, marastisch, nicht benommen, keine meningitischen Zeichen.

effloreszenzen, vor allem an Ellen.

Mikroskopisch: im Bereich der Narkose Hyperämies der Kapillarkörpers, in diesen organisierten Kapillaren reichlich gelapptkernige Leukozyten, z.T. auch hyaline Thromben. Eine Arterie der Subcutis ist durch einen frischen Abscheidungsthrombus verschlossen. Im periarteriellen Gewebe massenhaft Leukozyten.

Nebennieren: In den Nebennieren, vor allem in den Markanteilen, frische Blutungen, z.T. mit Degenerationen an Parenchymzellen und Leukozytenansammlungen, in Umgebung der Nebennieren stellenweise fibrinreiches Oedem.

Herzmuskel: Diffuse Myocarditis.

- 36 VI e 1 (46) 2 Jahre, kräftiges Kleinkind mit ausgebreiteter Scabies kam 30 Stunden nach plötzlichem Krankheitsbeginn fast moribund zur Aufnahme. Kind hatte am ganzen Körper emboliforme Hautblutungen, die sich jedoch wegen der Scabies nicht genau isolieren liessen. Inguor eitrige. 4 Stunden nach Aufnahme kam Kind unter heftigen Krämpfen ad exitum.

Sektionsbericht: Diffuse eitrige Meningitis, besonders an Hirnbasis, mehrere Eiterpfropfe in der re. Tonsille.

Frische Blutungen in beide Nebennieren, vorwiegend im Mark.

Geringe Blutung im hinteren Mediastinum und paraortalen Bindegewebe. Stauungsniere mit geringen Blutungen an der Mark-Rindengrenze, Stauungsmilz.

- 37 VI e 7 (47) 21.08. 3 Jahre. Das Kind kam etwa 30 Stunden nach Krankheitsbeginn zur Aufnahme. Aufnahmebefund: am ganzen Körper teils polymorphe

teils grosse livide variierte, flächenhafte Hautblutungen, letztere besonders in den abhängigen Partien. 45 Minuten nach Aufbruch exitus letalis. Sektionsbericht: eitrige Leptomeningitis diffusa, starkes Hirnödem, Zeichen stark erhöhten Hirndruckes, Stauungsnetzen, Stauungsnils, beiderseits frische Blutungen in das Nebennierenmark. Mikroskopisch: eitrige Leptomeningitis geringen Grades. Nebennieren bds.: erhebliche frische Blutungen im Mark, geringe in der Rinde.

- 18 VI e 19 (49) M., For. 24 Stunden vor der Aufnahme plötzlich mit Erbrechen und Durchfall erkrankt, 12 Stunden später Hautblutungen und zunehmende Lungenentzündung. 5 Stunden nach Aufbruch unter Krämpfen exitus letalis. Sektionsbericht: eitrige Leptomeningitis, eitrige Otitis media bds., pericardiale Hautblutungen, ep- und pericardiale Blutungen, subseröse Blutungen im Bereich des Kleins, subperitoneale pericardiale Blutungen, acute Lungenblähung, eitrige Entzündung der Leber, Thyroideahyperplasie. Mikroskopisch: in der weichen Hirnhaut frische, eitrige Leptomeningitis. Nebennieren: geringe Markblutung, hoher Lipoidgehalt der Rinde. Nieren: diffuse, feinstropfige Verfettung, in einzelnen periporösen Feldern lymphocytäre Infiltrate. Milz: Geringe feinstropfige Fettinfiltration der Epithelien, der Hauptarterie und Schleimhaut.

- 39 VI e 12 (40) F., Ge. 1 1/2 Jahre, 1/2 Jahr vor M.-Erkrankung Knochentuberkulose und infamante. Einen Tag vor Aufnahme mit Erbrechen und Fieber erkrankt, gegen Abend Bewusstlosigkeit.

Von 42 durch Mikroskopie an histologisch präparierten Kindern wiesen 35 das Vorhandensein einer Hypophysenvergrößerung auf. Ein Kind zeigte durch eine Hypophysenvergrößerung einen nicht unmerklichen Anstieg der Hypophysenwerte. Ein Fall, bei dem infolge einer Hypophysenvergrößerung eine Nebenhodenentzündung aufgetreten war, stellte der Pathologe neben Hypophysenvergrößerung eine Vergrößerung des gesamten lymphatischen Systems fest. Bei einem einzigen Kinder wurde festgestellt, dass eine eventuelle noch einmal nicht zur Bildung gelangte Nebenhodenentzündung infolge einer Hypophysenvergrößerung entstanden ist. 15 Kinder starben innerhalb der ersten 48 Stunden der Erkrankung. Die übrigen 27 starben alle mit dem gleichen Zeichen der extremen Kreislaufschwäche zur Ursache. Wir treffen auf geringe Röntgenveränderungen und verschiedenartige Veränderungen des Nebenhodensmarkes: Hypertrophie, Blutungen und auch entzündliche Prozesse. Deutet nun die Hypertrophie auf eine beginnende Entzündung des Organes hin? Hier ist eine Entzündung oder eine stärkere Vergrößerung, besonders in toxischen Zuständen, nicht immer möglich, weil auf, da das System nicht nur bei M. Infektion, sondern auch bei anderen schweren toxischen Zuständen infiziert ist. Es ist zu erwarten, dass die Hypophysenvergrößerung auch die Funktion des Körpers. Eine Vergrößerung der Hypophysenvergrößerung sind die Nebenhodenvergrößerungen bei einer toxisch-infektiösen Erkrankung besonders stark in Mitleidenschaft gezogener Kinder. Es ist zu erwarten, dass bei toxischen, ja überhaupt bei allen toxischen Erkrankungen eine Erhöhung des Kohlenhydratstoffwechsels, Künste der Gendarmen, der ein rasch ansteigender Fieber gibt, nicht das Anzeichen einer größeren Abwehrleistung infolge Abwehr der Nebenhoden durch Bakterien oder durch Toxine sein, und die auftretende extreme Temperaturerhöhung auf die aus diesem Vorgang resultierende Vermehrung des Kohlenhydratstoffwechsels zurückgeführt.

werden? Warum soll es erst, das in Temperaturerhöhungen normale Temperaturerhöhungen erzeugt werden, wenn klar ein Organ, das von Infektionen befreit ist, in Mitleidenschaft gezogen wird, die Mitleidenschaft ist, die Temperatur durch Bakterienabschüttung, der eine Erhöhung der Kohlendioxid-Erzeugung, die die Wärme zu lassen. Kühnlich berichtet von hohen Fiebererhöhungen im Beginn einer typhösen Infektion, die dann immer mit morten rapiden abklingen. Es wäre anzunehmen, dass die Nebenniere gerade infolge bakterieller Toxinwirkung so schwer geschädigt werden kann, dass der Fieber auf, dass Zirkulation in den inneren Organen (Hieren, Myocard, Endocari, Milz, Leber, Nieren, etc.) des Organes, dass Organen nur dann vorhanden, wenn auch Nebennierenarterien vorhanden sind. Hier ist es allerdings nicht möglich zu sagen, ob es sich um eine allgemeine, gleichzeitige, schwere toxische Schädigung der Kapillaren aller Organe handelt, oder ob die Störung des Nebennierenmark auf Grund einer Bakteriensekretion oder einer frühzeitigen toxischen Schädigung der Kapillaren dieses Organes erfolgt, die dann eine Funktionsstörung der Nebenniere nach sich zog. Dass die bei diesen Kindern auf die anderen Organe eine wirkenden Meningokokkenkonzentration schwere Schäden verursachen, ist aus der in mehreren Publikationen erwähnten feintropfigen Lebererkrankung ersichtlich, die sich auch bei Infekten einer Nebennierenarterien fand. Sollte nun eine Störung in der Nebennierenarterien eine geringere Adrenalinvermehrung des Körpers, durch welche die Zirkulation in die anderen Organe hervorgerufen worden, verursachen? Die in diesem Teil berichteten Fälle (Hieren, etc.) scheinen mir dazu zu bejahen.

Bei den zur Beobachtung gekommenen 11 Fällen von Häm.-P. handelt es sich hauptsächlich um Infektionen in das mark. Bei Kindern werden allerdings auch Hyperämie bzw. geringe Störungen in der Neben-

nieren oder auf die anderen Organe, welche die Blut bei diesen Vorfällen durch einen Gefäßwechsel im Nierengebiet, flüchtiger oder weniger, unter der Haut, der demnach blutleere Gefäße zwischen der Haut und Muscularis im Gefäßsystem, durch ein Gefäßgefälle im Spinalmark erhalten. Das vergrößerte Blutgefäß nach Bedarf abblutet, der Splanchnicus. So finden wir dann bei Häm. 17 auf. auch die Abzweigungen in der Lendenmark, subplacenta, Häm. 18, ep. und pericardiale Abzweigungen sind nicht mit. gemein angenommen, dass das Abbluten der Gefäße vor allem auf die Gefäße des Spinalmarkes, aber einen Fortsetzungen im Markes besteht, und dass die Blutgefäße leer. So liegt also auch die angeführten Fischschuppen des Spinalmarkes verantwortlich zu machen, wenn es der Natur der Fälle des Lebensvorgangs von Abzweigungen der zündlichen Processen betroffen war.

MATELKA, der sich vorwiegend mit Fieber v. a. e. b. beschäftigt, fand allerdings, dass bei dieser Art von Infektionskrankheiten vorwiegend die Niere betroffen sei. Der Behauptung "2. ist zu vermuten, dass der Tod nicht durch Ausfall der Niere, sondern primär infolge der Toxikose resultiert, was sich bei Aufstellung dieses Hypothesen auf Therapie, bei denen der Ausfall der Niere in der Regel erst nach 3 Tagen bemerkbar war, und dass diese bei der Therapie mit H. v. a. e. b. laufen, ist nicht wiederzuersehen, sondern die Tierversuche sind mit gesunden Tieren durchgeführt, während es sich bei dem mit H. v. a. e. b. kranken liegenden Kind um einen mit letzter Kraft um seine Existenz kämpfenden Organismus handelt, den der Ausfall eines wichtigen Stoffwechsel- und Kreislaufreglers weit gehender und eher trifft. 2. ist zu vermuten, dass die Nierengaben zu niedrig dosiert waren. Das Kind Marcel M. bekam 50 mg Furoveron injiziert, schon in den ersten

Somit nach dieser Komplexinjektion schwanden die sogenannten intravitrealen Totenflecken an den abhangigen Körperpartien. Das Kind wurde geheilt. Bei einigen anderen Kindern gab man auch Hinderapapara, selbst in weit geringeren Dosen und ohne sichtbaren Erfolg. Therapieversuche mit Kernen des Karies wurden hier nicht unternommen. Es liegt jedoch nahe, weil das Mark der Nebenschilddrüse bei den meisten (12) mit W. F. G. zur Antipsie gekommenen Patienten gestählt war, den mit oben geschilderten Symptomen aus Aufnahme kommenden Kindern Adrenalin oder das in seiner Wirkung auf den Kreislauf äquale, länger haltbare Arteronol im Form eines Omentropies zu zuführen. (Therapieversuchung von Herrn Prof. Tschann)

S I E B E N .

Das Auftreten einer Diphtherie hängt nach Mikulicz von einer Verschlimmerung des Karies durch die nicht als Kariesbeseitigung der oben angeführten Weise angesehen, aber eben zur Anhäufung der Möglichkeit einer Verschlimmerung durch andere Gründe zu berechnen. Diese Faktoren sind: eine Verschlechterung durch die Diphtherie, dann von Infektionskrankheiten auch eine Infektion von neuen Bakterien ausstrahlende Infektionen. Auch angegeben werden. Wie haben in der Klinik 14 und 21 Patienten bestanden. Dieser, deren Karies sich längere Zeit mit den Kariesmitteln nicht abstellen ließ und Fortgeschritten, dann auch im Verlauf der Erkrankung die Reaktion der Infektion auf die Infektion. Während bei beiden Kindern, bei denen es sogar kritisch herabfiel, der Symptom sich als Infektion mit erhöhten Temperaturen zeigte und keine eine Fieberung mit Temperaturabfall vor sich und

Im Fekalien, wie wir sehen traten die Hantwühlungen
bei Kind 19 und 21 erst Wochen nach Entlassungs-
zeit auf. Also zu einem Zeitpunkt, da der Körper
schon intakter, gesünder war. Die Petechien
dürften in diesen Fällen wohl durch agglutinierte
Leukozyten verursacht sein. Eine Begründung
der Theorie scheint der Nekropsbericht des Pat. 11
zu geben: in der Zeit der Hantwühlung des
Kapillarkörpers und in erweiterten Kapillaren sehr
viele Leukozyten. Eine zugehörige Arterie
der Hantwühlung durch Abwandlungskoronbus verschlossen
in perivaskulären Gewebe massenhaft Leukozyten. Die in
den Hantwühlungen der Kinder 31 und 32 be-
zeichnete Befunde schließt sowohl für eine embolische
Koronbus als Fall 11 sehr als auch für eine
Leukozyten, die in der Zeit der petechia-
len Hantwühlungen zu beobachten ist. Es ist
bei Kind 11, das in der Hantwühlung sicher massen-
haft vorhanden. Dieser durch die Leukozyten
agglutinierte und in Hantwühlung und Hantwühlung
führt. Der Körper von der Hantwühlung war nicht hämorrhagisch
auf eine erhöhte Permeabilität der Kapillaren in-
folge erhöhter Permeabilität lassen die Leukozyten und
Leukozyten der Hantwühlung, die vor ausserhalb, bzw.
schliesslich Hantwühlung von Hantwühlung in diesen
Hantwühlungen sprechen, schliesslich.

Ob und wie weit sich die als für das Auftreten von
Hantwühlungen verursachend angesehenen Komponenten
"Hantwühlung, Hantwühlung, Hantwühlung" in den einzelnen Fäl-
len gegenseitig beeinflussen.

So wie bei der Hantwühlung 11 und 21 liegt sich der Be-
weis einer massenhaften Hantwühlung selbst
führen, weil je bei keinem der 11, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Es seien noch einige das 19. und 20. Jhr. der aufge-
stellten Hypothese der Sepsiskrankheit beleuchtende

deutet gleichfalls auf einen allergischen Zustand des Säuglings hin.

Im Krankheitsverlauf der Kinder 29 und 30 traten keine auf allergische Reaktionen verdächtige Symptome auf. Wir finden hier nach acutem Beginn eine schwere Meningitis neben einer Sepsis. Da es zu einer verstreuten Organmanifestation kam, kann hier wohl weder eine Pyrexie noch eine Allergie des Körpers vorliegen. Die Ursache des mit dem exitus verbundenen strengen Verlaufes dieser Erkrankung scheint eine größere Virulenz der Erreger zu sein. Es berichtet auch Uhlrich dass Untersuchungen, die 1911 in der Schweiz angestellt wurden, zufolge eine neue Epidemiewelle im Anstehen begriffen sei, deren Erreger ebenfalls Staphylokokken seien. In anderer Stelle wurde bereits erwähnt, dass anhand von Krankengeschichten zur Veranschaulichung über die Größe der Wirkung der Erreger in den einen oder anderen Falle ausgesprochen werden können. So können wie aus den obigen Ausführungen ersichtlich ist, zumindest zwei verschiedene Faktoren aus Milde der M.-Sepsis hervor zu rufen. Als andere Einwirkungen die Untersuchungen, die dann entweder Ectelien oder Diapylodien führen wird, hervorgehen. Die Sepsis könnte also 1. bei einem allergischen Organismus auftreten, was mit Hilfe von Antikörpern Paulsenellen durch agglutinierende Teste nachweisbar wäre. 2. könnte eine höhere Virulenz und größere Fortschritt der Keime einen septischen Kreislauf mit Zustand mit Schädigung der Kapillaren zu Folge haben. Da beide Sepsisformen zu gleichen Erscheinungsbild führen, dürfte es schwierig sein an Krankenhett sagen zu können, ob es sich um Sepsis und jenseit ein toxischer Zustand, es aber möglich, durch serologischen Antikörpernachweis, ob im ersten Fall. Vorhandensein von Antikörpern eine gewisse erfolgreiche Sensibilisierung des Kindes zur veranschaulichenden Sepsis zu

als häufigste Komplikationen der H.-Erbkrankung
 kamen sich beobachtend bei Stillen. Einige Säug-
 linge zeigten eine gestörte Dyspepsie. Letztere
 zeigt allerdings in diesem Alter auch bei anderen
 Infektionskrankheiten und Störungen des Allgemein-
 befindens aufzutreten und wird deshalb nicht ge-
 sonnt. Ferner beobachteten wir als Komplikation
 eines Hydrocephalus und Perikthalamien auf. Zwei
 Kinder bei denen ein Hydrocephalus vorlag, wiesen
 ein charakteristisches Bild auf. Sie zeigten nach
 10 tägiger Krankheitsdauer vorwiegend einen schwe-
 ren Hydrocephalus. Ein anderes hatte psychische Stö-
 rungen, ähnlich der Intelligenzphrenose (Kind hatte
 viel Weisheit).

1. Fall (185). F., 20. 1/12 Jahr, Aufnahmestadium:
 Fieber, Herz-Kreislaufstörung, Husten, Stöße,
 vergrößerte Lymphknoten, bei beiden Lungen perver-
 tierter alveolärer Atem, Bronchitis, Bronchitis.
 Diagnose: Bronchitis, Bronchitis mit perver-
 tierter alveolärer Atem, Bronchitis, Bronchitis.
 atitutio ad integrum.
2. Fall (186). F., 2. 3. 1890. Aufnahme 4 Tage nach
 Beginn der Erkrankung. Kräftiger Säug-
 ling, mäßige Blutverfärbung, starker Splenome-
 galie, Bronchitis, Bronchitis, Bronchitis, Bronchitis.
 Diagnose: Bronchitis, Bronchitis, Bronchitis, Bronchitis.
 atitutio ad integrum.

nig Liquor ab. Etwa 1/2 Stunde später exitus letalis.

sektionsbericht: Leptomeningitis purulenta, eitrige Bronchiolitis, konfluierende Bronchopneumonie des re. Lungenoberlappens, beiderseitige eitrige Otitis media.

43 VI e 18 (48) Schä., He. 4 Mo. Etwa 8 Tage vor Aufnahme Erkrankungsbeginn mit Husten und Schnupfen.

Nach der Aufnahme fand sich nur eine Bronchitis. In der Nacht vom 1. zum 2. Klt. Krämpfe, Fontanelle gespannt, vorgewölbt, Hypertonus der Extremitätenmuskulatur Liquor trüb, vereinzelt Meningococcen. Auf Penicillin und Sulfonamide Besserung. Am 11. Klt. erneut Temperaturanstieg, klingende Rga. re. Histen, keine Darfung. Stühle gehackt.

Diagnose: Bronchopneumonie und parenterale Dysenterie mit M.-Meningitis. Heilung auf Penicillin.

44 VI e 7 (49) Sch., He. 4 Mo. 6 Wochen zu früh geboren. Einen Tag vor Aufnahme mit Zuckungen und Schillen Aufschreien erkrankt.

Aufnahmefunde: sehr kranker Säugling, Arme und Beine krampfartig, Fontanelle ist kissenartig vorgewölbt, Myoklonus ++, Kernig +, Puls beschleunigt, Atmung gerötet, Liquor trüb-eitrig; 12 Klt. 4 Kugeln, eococci. Auf Penicillin i. l. Am 10. Klt. Hilse par 12 langsame Besserung, Temperatur sinkt. Am 11. Klt. Schlechterwerden der Hilse. Bis nach Karottensuppe 2 Tage lang wieder besser worden. Am 17. Klt. Allgemein-erkrankung stark verschlechtert. Otitis wurde durch Abkochen eingeschrieben. Am 19. Klt. feinblasige Rga. re. Hilse paraverbraut. Rg.: fleckige Zeichnung im Bereich des re. Hilus.

Unter erneuter Penicillintherapie, peroralen
Stropfgaben, parenteraler Flüssigkeitszufuhr u.
Eiweissmilch Heilung.

22. 11. 42 (34) Bl. Nr. 13/42 Janne, Kind, das vor
2 Tagen aus der Kinderklinik nach katarrh. In-
fekt. entlassen wurde und seit 4 Tagen erneut
mit Ery. Bronch., Fieber und Schnupfen erkrankt ist,
kann in schwerkranken Zustand zur Wiederaufnahme.
Anamnese: Kleinkind in mittelmässigem E.-
stadium. Husten, Fieber, Rhinorrhoe, starke
gerollte Inzession des Nasen-, Kachenhinterwand ge-
rollter, Schilddrüse, am re. Unterschenkel mehrere
kleine, blasse, runde, gerollte Papeln, Herz und
Lunge path. Befund, Lungen am 6. Kit. eitrig, ver-
grössert, geringe Pleuresen. R5-Thorax: kein
Anhalt für Pneumonie, Bronchitis-Lenke. 15. 200, Ery.
4. 11. 42, 15. 5. 42 Besserung auf Prontosil und
Erythromycin, antientzündliche und Serumreiz-
therapie. Zitiert in Bl. Nr. 13. Kit. 4. Am 21.
Kit. wieder eitrige Schnupfen, am 26. Kit.
Fieberanwendung auf 39. Auskultatorisch Pneu-
monie rechts, links, R5. Pleuresen re. Unter-
schenkel, vergrösserte Inzessionen, auf Freiluft-
Befund, Lungen, Pleuresen, Pleuresen, Pleuresen.
Die Meningeae zeigten für eine
Entzündung keinen Anhalt mehr.

Die Kinder 11 und 12 zeigen bereits bei der Aufnahme
einen geringen Grad von Fieber und es handelt es sich
um einen kleinen Grad von Fieber. Da der
Kliniker bereits eine Meningitis über eine
Meningitis in Betracht zieht, liegt es eine Meningococ-

erkrankungen im Beginn einen Katarth der Luftwege zeigten, sprechen diese bei der Aufnahme vorhandenen Lungabefunde mit genügender Sicherheit für eine durch Meningococcen hervorgerufene Bronchopneumonie. Tatsächlich fanden sich auch bei der Untersuchung des Bronchialsekretes eines Kindes (andere Sekrete aus den Bronchien wurden nicht untersucht) in diesen Meningococcen. Der Sektionsbefund des Kindes A1, der von einer eitrigen Bronchiolitis und einer konfluirenden Bronchopneumonie berichtet, weist ebenfalls auf diese Genese hin. Kind 43 starb bei W. in der stat. Behandlung eine Bronchitis auf, die sich zu den ersten 10 Klt. zur Bronchopneumonie entwickelte und sich am 11. Tage als solche bemerkbar machte. Kind 44 zeigte dagegen zur Zeit der Aufnahme und während der ersten Klinikstage keinerlei pathologische Befunde. Das am 12. Klt. auftretende Fieber können wir der Stille weist auf die beginnende Bronchopneumonie hin, wenn auch auscult. noch kein pathol. Befund zu erheben ist. (Nach Böhm) ist die beginnende Bronchopneumonie sowohl auscultatorisch als auch röntgenologisch schwer zu erkennen. 7 Tage nach der Verschlechterung des A. Z. liess sich die Bronchopneumonie sowohl durch das R. B. als auch durch die Auscultation nachweisen. Es sprach auf die wieder einsetzende Penicillin-Subjekt-Therapie auf an. Bei Kind 45 scheint es sich um einen zu seiner Schwachkraft geschwächten Körper zu handeln. Er starb 10 Tage nach der ersten Klinikbehandlung eines W. Fieberanfalls nach eigentümlicher Stimmungssteigerung gegen eine katarrhalische Infektion. Eine W. -Schwankung war, ist nicht mehr zu constatieren. Bei der Aufnahmebefund noch am 1. Klt. charakteristische W. -Fieber lassen einen Verdacht auf eine bestehende Pneumonie aufkommen. Der pathol. Befund des Kindes spricht allerdings für eine durch Meningococcen hervorgerufene Bronchopneumonie. Kind 46 starb am 21. Klt. auf

ausgesprochen geringe bis keine Infektionsrate.
Tageszeiten (morgens) und saisonale Erkrankung
von Meningitis und Otitis.

VI 4 2 (11) 10, 12, 18. 2 Tage vor Erkrankung
starke Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
VI 4 2 (11) 10, 12, 18. Temperatur 40°. Leichte
Krämpfe.

ausgesprochen. Kräftiger Stenotomie, Herpes.
ausgesprochen, Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
Leichte Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
ausgesprochen. Kräftiger Stenotomie, Herpes.
ausgesprochen, Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
Leichte Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.

VI 4 2 (11) 10, 12, 18. Unter 1. Meningitis nach
Verkrankungen.

VI 4 2 (11) 10, 12, 18. Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
ausgesprochen, Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
Leichte Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
ausgesprochen, Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
Leichte Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.

VI 4 2 (11) 10, 12, 18. Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
ausgesprochen, Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
Leichte Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
ausgesprochen, Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
Leichte Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
ausgesprochen, Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
Leichte Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
ausgesprochen, Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
Leichte Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.
ausgesprochen, Fieber, die nach 1 Tagem Besserung zeigte.

Schwereform gehalten werden kann. In einigen Liquor Meningococcen. In Laufe der ersten 12 Std. auf Sulfonamide stetige Erweichung. In 15. Klt. steige nach grundlosen Weissen plötzlich tonig-schleimige Euktionen, die mit seitwärtiger völliger Kurze abwechselten. 17. gestiegen, 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Kind 52 zeigte seit Beginn der stat. Behandlung eine reichliche Liquorproduktion, die tägliche Entlastungspunktionen notwendig machte. Der ophthalmologische Befund und das Encephelogramm weisen auf einen beginnenden Hydrocephalus hin. In 10. Klt. wurde jedoch bemerkt, dass die Liquorproduktion spontan zum Stillstand kam. Bei der Entlassung war auch die Spannungspapille zurückgegangen. Kind 53 das ebenfalls Hydrocephalus Symptome zeigte, hatte einen Tumor, der die Entlastungsmassnahmen erschwerte, sodass Kind 53 an Hydrocephalus zugrunde ging. Kind 54 wie auch Kind 55 Symptome auf, die auf einen Hydrocephalus hindeuteten. Obwohl sich unter Penicillin die Infektion befinden langsam besserte und nach 15 Tagen sogar Entfieberung eintrat, so dass die Fontanellespannung immer wieder Entlastungspunktionen notwendig. Als jedoch am 31. Klt. eine parenterale Pyrexie auftrat, ward die Fontanellespannung geringer und am 32. Klt. bei Fortbestehen der Pyrexie stellte man eine eingesunkene Fontanelle fest. Das Kind ging an der Pyrexie zugrunde.

Kind 55 und 56 zeigten schon während des Verlaufes und auch nach Abheilen der M.-Erkrankung Träpse, die sonst bei und nach Encephalitis auftreten. Sollten hier die Erreger nicht nur eine Meningitis sondern auch eine Encephalitis hervorgerufen haben? Bei einer von MÜRING 1950 beschriebenen rezidivierenden Meningococceninfektion zeigte der Pat. nachher er

am 1. April als erstes Symptom der Erkrankung
im Bereich des Kopfes auftrat. Nach der in der
vorliegenden Arbeit fallig sind zu berücksichtigen
uns haben. Wie in der vorliegenden Arbeit
physiologisches Bild. Die in der vorliegenden Arbeit
der Klinik bei der 11. Aufnahme (Symptomatik)
konnte die Anamnese. Die in der vorliegenden Arbeit
Epilepsie durch die in der vorliegenden Arbeit
und das unwillkürliche Fahren vor der 11. Aufnahme (Symptomatik)
sind betroffen. Wie in der vorliegenden Arbeit
das Befinden und die Veränderungen der in der vorliegenden Arbeit
sind die in der vorliegenden Arbeit. In der vorliegenden Arbeit
Epilepsie reizes. Wie in der vorliegenden Arbeit
scheinbar in der vorliegenden Arbeit.

Es ist anzunehmen, dass beim Überleben von 1. April
die in der vorliegenden Arbeit. Wie in der vorliegenden Arbeit
beständlicher. Wie in der vorliegenden Arbeit
produktion. Wie in der vorliegenden Arbeit
quere im Bereich des Kopfes. Wie in der vorliegenden Arbeit
eine Sekretion. Wie in der vorliegenden Arbeit
entschieden. Wie in der vorliegenden Arbeit
Tatsache, dass die in der vorliegenden Arbeit
den für Stoffe, die in der vorliegenden Arbeit
nicht in der vorliegenden Arbeit. Wie in der vorliegenden Arbeit
wäre also. Wie in der vorliegenden Arbeit
Toxinen das Epithel der in der vorliegenden Arbeit
darstellende Flüssigkeit. Wie in der vorliegenden Arbeit
ne. Wie in der vorliegenden Arbeit
seits könnte die in der vorliegenden Arbeit
der bei entzündlichen. Wie in der vorliegenden Arbeit
Eine analoge. Wie in der vorliegenden Arbeit
Zum dritten wäre es denkbar, dass die in der vorliegenden Arbeit
Abflussweg über die in der vorliegenden Arbeit
häuten ablaufende. Wie in der vorliegenden Arbeit
legt wird oder diese. Wie in der vorliegenden Arbeit
nicht gewachsen sind. Wie in der vorliegenden Arbeit
Kindes 52 zeigt, dass der in der vorliegenden Arbeit
grossen Abfluss, anscheinend nach Abklingen der in der vorliegenden Arbeit

permanente, ein Kind eine Schizophrenie und bei 4 Kindern
ergab die Festlegung eines künftigen Entwicklungsstandes bei
einem Kind eine mäßige Schizophrenie, 11 Kinder wurden
im Bereich der Intelligenz einer Schizophrenie ausgesetzt und 2
von starben. Bei 3 Kindern wurde eine Schizophrenie im
2. klinischen Feststellungsfall, ein Kind zeigte eine
Störung der Schizophrenie, die eine geringfügige Schizophrenie
noch während des klinischen Feststellungs Falles. In 2
Fällen wurde bei der Aufnahme eine Schizophrenie festgestellt
beide Seiten konzentriert, die eine Schizophrenie der
Schizophrenie durch bilateralen Schizophrenie festgestellt
hatte, eine einseitige Schizophrenie wurde festgestellt.
Zwei der Kinder verließen im klinischen Fall, bei 10
Kindern erfolgte durch Schizophrenie und Schizophrenie.
eine Schizophrenie ad ist, wie die 4 Kinder nach der
Schizophrenie Schizophrenie Schizophrenie in der Schizophrenie
klinik zeigte, liegen Kind wurde im Jahr 1942 mit
Penicillin und Sulfonamiden behandelt. Schizophrenie von
beiden anderen Schizophrenie im Jahr IV (Schizophrenie),
Serum, Schizophrenie und 1942 (Schizophrenie, Schizophrenie,
Fallen.

8 Patienten haben durch Schizophrenie ad Schizophrenie
Schizophrenie des Schizophrenie bei 3 Kindern, ein
Kind zeigte eine Schizophrenie, Schizophrenie, die
zum Zeitpunkt der Schizophrenie aus der Schizophrenie
lung völlig zurückgebildet war.
Weitere Schizophrenie, die Schizophrenie Schizophrenie
werden unter diesen mitgeteilt.

Strabismusconvergens unverändert, Linsen auch keine Vorwölbung der Fontanelle nicht sehr ausgeprägt, Entlassung ausser Strabismus convergens bds. kein pathol. neurolog. Befund vorhanden.

Nachuntersuchung 1950:

Nach Angaben der Mutter habe der Strabismus nach der Meningitis nicht bestanden. Kind sei erst mit 7 Jahren zur Schule gekommen und dann in der Hilfsschule gewesen.

Befund: Bei Intelligenzprüfung konnte der 14 jährige Junge weder den Unterschied zwischen Tisch und Leiter noch den zwischen Bach und Teich annähernd erläutern.: "Wenn man in den Teich fällt, kommt man nicht heraus. Aus dem Bach kommt man besser heraus." Sätze aus drei angegebenen Worten vermag der Junge nicht zu bilden. Die Wortflüssigkeit ist jedoch gut. Er befindet sich auf einem Spengler in der Lehre und kann über die Tätigkeit seiner Tätigkeit befragt gut Auskunft geben.

Bef.: schmaler, mässig ernährter 14 jähriger Junge. Hautdurchblutung genügend.

Kopf: Stark vorspringende Stirnhäuter, keine Klopfempfindlichkeit. Nur bei Strabismus convergens bds. Pupillen reagieren auf L. u. R. Nerven o.p.B., ausser Abducens.

Thorax: die Röntg zeigt eine deutliche Mißposition. Thorax verformt, untere Apertur weit, Rosettenraum. Harrison'sche Furche.

Keine Reflexdifferenzen, keine patholog. Reflexe. Ophthalmologischer Bef.: Strabismus convergens paralyticus bds., schiefer, ungleicher, exotropischer, leichte Abblassung der li. Papille. sonst o.p.B.

Kind 62 zeigt ausser einer verbreiterten Fontanelle des PSR keinen Anhalt für einen postmeningitischen Dauerschaden. Die bei der Nachuntersuchung festge-

Es folgen sieben Krankenberichte mit Nachuntersuchungsbefunden von Kindern, die mit Gehörstörungen entlassen wurden.

65 VI d 3 (39) 13. Jhd. 10 9/12 Jahre. Stet. Aufnahme am 2. Krankheitstage. Aufnahmebefund: Saccus r. kl., Nackensteife, Kernig +, Liquor eitrig, im Anfall von Meningepressen. Am 4. Mit Temperaturanstieg auf 40³⁹. Schwerhörigkeit, keine Ohrschmerzen. Unter Sulfonamiden Heilung der Meningitis. Bei der Entlassung li. völlige Taubheit, r. Gehör in Sprache in Entfernung von 1/2 m. (Patient sprach nicht zur Nachuntersuchung).

66 VI d 35 (40) 4 1/2 Jahre. Erkrankungslage schon Tag vor Aufnahme. Verlegung aus einem anderen Krankenhaus, wo bei der A.P. eitriger Liquor aspiriert wurde.

Aufnahmebefund: Nackensteife, Kernig +, Lymphogranulomat +, zahlreiche bis bohnengroße Lymphknoten im Nacken und submaxillar. Im Liquor bakteriologische reichliche Meningococcen. Unter Serum und Sulfonamiden Heilung der Meningitis.

Bei der Entlassung wurde li. nur laute Wortsprache in nächster Nähe gehört.

Nachuntersuchung 1970:

Das Kind hatte während der ganzen Zeit keine Schwindelanfälle oder sonstige Beschwerden.

Kopf: nicht kloßempfindlich, Kopf frei, Pupillen reagieren prompt bei L.-u.-C.-Prüfung.

Hirnnerven ohne pathol. Befund.

Reflexe seitengleich und von normaler Stärke.

Herz und Lunge o.p.B.

Nachuntersuchung in Hals-Nasen-Ohrenklinik: Mittelschwerhörigkeit li. Vestibularis bds. intakt.

37 VI d 55 (40) 11 1/2 Jahre. 4 Tage vor Aufnahme
mit Erbrechen, Tachykardie, Fieber und allgemei-
ner Benommenheit erkrankt.
Aufnahmekontakulvergrößerung mit geröteten, ent-
zündeten Augapfeln, Schwellung der Lidmarginen,
graphische + im vorderen Teil der Netzhaut
Lymphdrüsenläsion sichtbar, Druck erhöht, in der
Strich verengt. In der Netzhaut keine Abgrenzung
Junge über Schwerhörigkeit des. ausgesprochen
1 1/2 m Entfernung vermindert. Ophthalmosk. -
geringe Unschärfe der Papillen.
Bei der Entlassung keine Besserung der Seh-
störung re.

Директор О.П.В.

DIR night analgesic, 100 mg, 100 mg after 4 hr. normal.

Herz und Lunge o.p.B.

Befund in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik: Das linke Ohr Tympan, das völlig von Cerumen durchwachsen war entfernt. Danach blieb eine als Mittelohrschwerhörigkeit bezeichnete Gehörstörung zurück. Vestibularis intakt.

38 VI d 62 (40) 5 Jahre 3 Tage vor Aufnahme der
brechen, Schmerzen im Hinterkopf und in den
kehlen erkrankt.

Aufnahmedat.: Bewusstlosigkeit, Oligoclonen +, Kern-
Burdzinsky +, Kernographismus +, Herzzeitl. be-
schleunigt, Rachen stark gerötet, auf re. Tonsille
einige stecknadelkopfgroße Eitertropfen, In-
guor citrig, im Ausstrich Meningococcen. Therapie
Sulfonamide. Vom 2.-5. Kl. tiefe Bewusstlosigkeit
Wiedererlangung des Bewusstseins starke Gehör-
hörigkeit, die nach einigen Tagen nachließ. Letzte

Umgangssprache wurde in 1. u. 2. Jahren erworben. Am 13. Klt. meningitische Symptome nach einer Erkältung. Nach einem mit exzessiver Nachschüttung von Eiter belag auf den Tonsillen und Adenoiden. Am 14. Klt. them einhergehenden Temperaturalstieg wieder Verschlechterung des Gehörs. 4 Tage darauf trat Besserung des Hörvermögens auf.

Nachuntersuchung 1942: zeitweilig heftige Kopfschmerzen, Schwindel, Unsicherheit beim Gehen. Hals-Nasen-Ohrenklinik 42: An Taubheit, hochgradige Schwerhörigkeit rez., fast totaler Vestibularisausfall.

Nachuntersuchung 1950: Kind ist leidend, aber keine Kopfschmerzen. Befund: normal entwickeltes Mädchen, Intelligenz überdurchschnittlich, keine Klopfempfindlichkeit des Kopfes, BAP normal, Irlenreaktion bei 2. u. 3. u. C.-Prüfung normal.

Nirnnerven o.p.B.

BDR seitengleich, normal stark, ebenso 1950, 1951 träge. Romberg leicht +. BNC 1950: normales Hörvermögen li., hochgradige Schwerhörigkeit re. Vestibularis beiderseits caloric und rotatorisch nicht erregbar.

69 VI e 4 (46) For., I. 5 Mo. 2 Wochen vor 1935 geborener Säugling, 7 Tage vor stat. Aufnahme erkrankt, bis 6 Wochen vor Aufnahme auf der Geburtshausstation der Klinik in Behandlung.

Aufnahmebefund: krampfbarer Säugling, weisse Fontanelle weit offen, vorgewölbt, Berührungsempfindlichkeit +, Dermographismus +, überhörschallig, grosse Kraniotabes am Hinterkopf, Liquor citrus, im Ausstrich vereinzelt Meningococcen. Heilung der Meningitis unter Sulfonamiden. Entlassung nach Hause.

Bei Nachuntersuchung 47 hochgradige Schwerhörigkeit festgestellt.

Nachuntersuchung 50: Kind hatte seit der Entlassung weder Schwindelanfälle noch klagt es über Kopfschmerzen. Bereits einmal re. und einmal li. Otitis media, immer mit eitriger Sekretion. Befund: munteres, intelligentes Kleinkind, das es gut versteht sich durch Gesten verständlich zu machen.

Keine Klopfempfindlichkeit des Kopfes, MAP frei. Pupillen reagieren bei L.-u.C.-Prüfung normal. Hirnnerven ausser Acusticus und Vestibularis o.p.B.

Herz und Lunge o.p.B.

Reflexe seitengleich und von normaler Stärke.

Bef. H.M.O.-Klinik: Totaler Ausfall des Vestibularis und Cochlearis beiderseits.

Befund aus Augenpoliklinik 1947: brechende Medien klar, Papillen scharf begrenzt, Fundus ohne pathol. Befund.

- 11 VI e 9 (49) 2 9/12 Jahre. Schwester des Vaters an Tbc gestorben, Bruder des Vaters wegen Tbc dauernd in ärztl. Behandlung. Kind neigt zu Bronchitiden, hustet seit 3 Wochen, spuckte Schleim aus. 3 Tage vor Aufnahme Temperatur 40° , Erbrechen, Kopfschmerzen. Aufnahmebefund: Kind in schlechtem A.Z., Kopf in Nacken zurückgebeugt, Beine angezogen, somnolent, cyanotisch, Berührungsempfindlichkeit ++++, Kernig +, Atemgeräusch rauh, Ciemen über Unterger-schossen hinten. Liquor eitrig, im Ausstrich gram-negative Diplococcen und auf Influenza verdächtige Stäbchen. Röntgenuntersuchung der Lunge: activer Hilusprocess mit perihilärer Bronchitis. Wegen dieses Befundes und der Familienanamnese wurde neben Panicillin und Sulfonamiden auch Streptomycin gegeben und zwar auch i.l., Strepto. nach etwa 5 Tagen wieder abgesetzt. Am 7. Kit.

Schmetter des Schädels festgestellt, Liquor ist klar, aber Druck erhöht. Sprache noch verstanden. Ophthalmologisch wurde Verdacht auf Opticusatrophie geäußert, Kind fixierte aber noch. Encephalogramm bestätigt Verdacht auf Hydrocephalus internus. 31 Tage nach Behandlungsbeginn fällt zunehmende Schwerhörigkeit auf, Sprache ist deutlicher, Sehstörungen noch nicht wahrnehmbar. In der 8. Klinikwoche wurde Kind mit völliger Taubheit nach Hause entlassen.

Nachuntersuchung 1950: kräftiges, gepflegtes 3 jähriges Kind, das sich mit den Gegenständen in seiner Umgebung lebhaft beschäftigt, verständigt sich mit der Mutter durch Zeichen und eine recht unarticulierte Sprache.

Hirnnerven: Facialis, Hypoglossus, Okulomotorius, Abducens intakt. Romberg positiv.

BBN normal stark und seitengleich, FBR und KKK schwer auslösbar.

Lunge: re. hinten bronchitische Rgs.

Herz: o.p.B.

Befund in Ohrenpoliklinik 1949: Trommelfelle geschlossen, reizlos,

Hörprüfung: Luftleitung $\frac{1}{2}$, Knochenleitung fraglich.

Vestibularis beiderseits nicht erregbar.

Befund in Augenpoliklinik 1950: Fundus o.p.B., Papille beiderseits scharf begrenzt, keine Stauungserscheinungen.

17 VI s 2 (44) Gs., Er. 3 6/12 Jahre.

Ausführlicher Krankenbericht siehe oben unter recidivierender M.-Meningitis.

Befund in Ohrenklinik während Meningitis am 16.

Kit. Trommelfelle beiderseits leicht eingezogen,

bes. li. Kind reagiert weder auf Anruf noch auf Stimmgabel. Vestibularis: nach Kaltspülung vereinzelte Zuckungen.

Nachuntersuchung 1950:

Kind hatte in der Zwischenzeit keine Vertikalen, keine Schwindelerschüppungen.

Befund: kräftiger Junge, der etwas unruhig sein scheint, aber an Eingebung keinen Anteil nimmt.

Kopf nicht klopfempfindlich, Pupillen reagieren gut auf Lichteinfall,

Hirnnerven: Facialis, Hypoglossus, Oculomotorius und Abducens intakt.

Reflexe normal stark und seitengleich.

Romberg leicht positiv.

Herz und Lunge o.p.B.

Untersuchungsbefund in der Ohrenklinik 1950:

Totaler Ausfall des Vestibularis und Cochlearis beiderseits.

Die während der Erkrankung des Kindes 61 im Jahre 1949 mit Temperaturen um 40° auftretende Scherkrampfartigkeit deutet auf einen entzündungsprozess, wahrscheinlich metastatischer Art, in den Ohren hin, der jedoch völlig schmerzlos war. Ob es sich bei der Schwerhörigkeit den Schwerhörigkeit li. um eine Mittel- oder Innenohrschädigung handelte, kann nicht mitteilt werden, weil die Patientin im Jahre 1950 nicht zur Nachuntersuchung erschien.

Bei Kind 66, dass dem Krankenbericht zufolge ebenfalls bewusstlos war, verlief der Prozess, der zur Mittelschwerhörigkeit führte, ebenfalls ohne Schmerzen, sodass die Gehörstörung nicht bemerkt wurde.

Patient 67 trug auch eine Mittelschwerhörigkeit davon.

Kind 68 wies, als es das Bewusstsein nach einer kurzen Benommenheit wiedererlangte eine erhebliche Gehörstörung auf, die nach kurzer Besserung, mit erneutem Temperaturanstieg sich fast bis zur Taubheit steigerte.

gerade als wenn sich hier um eine unvollständige Mittel- und Innenohrerkrankung handelt, die durch die der Vestibularis beiderseits entsprechende laterale Innenohrerkrankbarkeit bestimmt, aber ganz andersweise nur auf die rechte Seite.

Kind 89, das erst nach 7 Jahren (1949) in ein Kinderlager zur stat. Behandlung kam, zeigte bei der 1. Untersuchung 1949 einen totalen Ausfall der Vestibularis beiderseits, beiderseits aber ein normales Zwischenohr. Bei der 2. Untersuchung im Jahre 1950 bei der Untersuchung 1950 im Jahre 1950 zeigte sich ein kret. Das späte eintreten der Therapie 1949, die keinen geringen Teil zur Entstehung des schließlichen Dauerschadens hat.

Laut Bericht des HNO-Klinikleiters aus Düsseldorf von 1944 waren die Trommelfelle bei Kind 89 schon seit längerem, was auf das Alter eines Jahres hindeutet, entzündet, während in der Zeit vorher oder das Mittelohr abnormale Veränderungen zu dieser Zeit auch eingetreten. 3 Tage nach Beginn der Vorverleibung mit Sulfonamiden trat ein schweres eitriges Mittelohr ein. Man vermutet, dass die Krankheit durch eine eitrige eitrige getretene Hyperämie des betroffenen Ohrs eine Streuung aus den Gehörknöchelchen wegen der damit das Recidiv verursachten eine totale, einen völligen Ausfall der Vestibularis auf der rechten Seite zurück.

Den gleichen Dauerschaden hat Kind 90, das bei den Verhältnissen liegen, die eine Infektionskrankheit das Kind erstens verursachen lässt, eine Meningokokken + Infektion, hatte und zweitens einen Verdacht auf Meningitis, eitrige Mittelohrerkrankung erhielt, das 1949 noch eine der Vestibularis und Vestibularis schädigende Wirkung hatte.

Es wurden also insgesamt 11 Kinder (aus den 10 erwähnten kommen noch 4 Gehörstörungen aus dem Jahrgang 1950, deren Dauerschaden erst bei der 2. Untersuchung

In der vorliegenden Arbeit wird über Beobachtungen berichtet, die bei der Behandlung von 358 Meningococcenerkrankungen in den Jahren 1935 - 1953 gemacht wurden. 211 der Kinder erkrankten an Meningitis, davon starben 36 Kinder, 147 an Bakteriämie, 64 an M.-Sepsis, davon starben 44 Kinder. Die M.-Infekte zeigten in den Jahren 1935 - 1938 sporadisches Auftreten. Überwogen der meningitischen Form. Die höchsten Erkrankungszahlen trafen 1940 und 1953 auf. Zwischen diesen Jahren zeigte ein Anstieg 1943, sporadisches Auftreten von 44 - 47. Im Jahre 48 Anstieg der Morbiditätskurve. Nur in den Jahren 1941 und 1950 überstieg die Anzahl der septischen Erkrankungen die der meningitischen um 3 bzw. einen Fall. Eine eindeutige Trennung der Meningitiden liegt auf Grund der hier gegebenen Beobachtungen nicht vor. Die Zahl der meningitischen Erkrankungen stieg und fiel fast parallel der Zahl der meningitischen. Die meisten septischen Erkrankungen trafen im Januar auf, während die meningitische Form einen Gipfel zeigt. Die geringsten Erkrankungszahlen wiesen die Monate Juli-Oktober auf. In den ersten 6 Lebensmonaten fand sich sowohl die höchste Morbidität als auch die höchste Letalität. Die Zahl der meningitischen Erkrankungen ist in diesem Alter 7 mal höher als die der septischen. In den folgenden drei Halbjahren ebenfalls Überwiegen der meningitischen Form und langsames Sinken der Anzahl der septischen Erkrankungen. Im 1. Halbjahr zeigt doppelt so viele septische Erkrankungen wie meningitische. In diesem Alter kein Sterben durch Meningitis aber 12 exites durch Sepsis. Von den 358 M.-Infekten trafen 215 Kinder unter 4 Jahren, 79 davon waren noch nicht 6 Monate alt, 31 befanden sich im Alter von 6-12 Monaten. Über 1/3 aller M.-Erkrankungen traf also Kinder unter einem Jahr.

nierenlosen Tieren durch Gabe von Nierentextrakt die Paraganglien befeuchtet werden, Adrenalin zu produzieren, scheint in diesen Fällen doch wohl ein Ersatzlaufversagen infolge Nebennierenschädigung vorzuliegen. 15 an M.-Sepsis ad vitam gekommene Patienten wiesen autopsisch das Waterhouse-Friderichsen-Syndrom auf. Es fanden sich vorwiegend schwere Veränderungen des Nebennierenmarkes, geringere der Rinde.

In den Erwägungen über die Entstehung der Nebennierenschädigungen wurde die Möglichkeit einer Blutung in die Nebenniere sowohl infolge Kapillarschädigung durch Toxine als auch infolge Ilkosteronierung von Gefäßen des Parenchyms durch Bakterienemboli erörtert. Es wurde ferner an eine besondere Funktion der Nebenniere bei Infektionskrankheiten gedacht. Die M.-Tiere sind nach DIETLICH ein bei Infektion sehr frühzeitig in Mitleidenschaft gezogener Reaktionsort und sind in der Lage einen von Bakterien oder Toxinen gesetzten Reiz durch eine Adrenalinabsonderung, der eine Kohlehydratstoffwechselsteigerung und damit ein Temperaturanstieg folgt, zu beantworten. Sodass beispielsweise Schüttelfrösse bei septischen oder allergischen Erkrankungen und die diesen folgende Temperaturerhöhung durch die oben erwähnten Reaktionen zustande kommen könnten. Zur Behebung des Schockzustandes in dem sich die M.-Sepsis-Patienten z.T. bei der Aufnahme befinden, werden Arterien- und Nebennierenrindenhormongaben empfohlen.

Die häufigsten Komplikationen waren Pneumonien, Otitiden, Hydrocephalus. Wir fanden im Beginn der Erkrankung bei 5 Kindern eine Bronchopneumonie, bei einem Kind eine Oberlappenpneumonie. 3 Kinder zeigten während des Krankheitsverlaufes eine Bronchopneumonie und bei 4 Kindern ergab die Sektion eine eitrige Bronchopneumonie, bei einem eine eitrige Pneumonie.



Schwerkränktheit, 1 Monat lang vollständige Bett-
zeit. Bei einem Kind mit unvollständiger Immunität
schon bei der ersten Grippe Infektion aus-
gebrochen.

Nachhergesundheit im August 1918.

Es wurden 24 Tage während der schweren Phase
des Infektions ausbleiben und es gelang es, das Kind
"heilen" zu lassen. Infektion aber noch immer
mit Immunität. Keine.

Von der 11. September 1918 bis 1. Oktober 1918
wurde, 1. Oktober 1918 bis 1. November 1918
sowohl bei der Grippe als auch bei der
Infektion in der Infektion. 1. November 1918 bis
1. Dezember 1918. 2. Dezember 1918 bis
1. Januar 1919. 3. Januar 1919 bis
1. Februar 1919. 4. Februar 1919 bis
1. März 1919. 5. März 1919 bis
1. April 1919. 6. April 1919 bis
1. Mai 1919. 7. Mai 1919 bis
1. Juni 1919. 8. Juni 1919 bis
1. Juli 1919. 9. Juli 1919 bis
1. August 1919. 10. August 1919 bis
1. September 1919. 11. September 1919 bis
1. Oktober 1919. 12. Oktober 1919 bis
1. November 1919. 13. November 1919 bis
1. Dezember 1919. 14. Dezember 1919 bis
1. Januar 1920. 15. Januar 1920 bis
1. Februar 1920. 16. Februar 1920 bis
1. März 1920. 17. März 1920 bis
1. April 1920. 18. April 1920 bis
1. Mai 1920. 19. Mai 1920 bis
1. Juni 1920. 20. Juni 1920 bis
1. Juli 1920. 21. Juli 1920 bis
1. August 1920. 22. August 1920 bis
1. September 1920. 23. September 1920 bis
1. Oktober 1920. 24. Oktober 1920 bis
1. November 1920. 25. November 1920 bis
1. Dezember 1920. 26. Dezember 1920 bis
1. Januar 1921. 27. Januar 1921 bis
1. Februar 1921. 28. Februar 1921 bis
1. März 1921. 29. März 1921 bis
1. April 1921. 30. April 1921 bis
1. Mai 1921. 31. Mai 1921 bis
1. Juni 1921. 1. Juni 1921 bis
1. Juli 1921. 2. Juli 1921 bis
1. August 1921. 3. August 1921 bis
1. September 1921. 4. September 1921 bis
1. Oktober 1921. 5. Oktober 1921 bis
1. November 1921. 6. November 1921 bis
1. Dezember 1921. 7. Dezember 1921 bis
1. Januar 1922. 8. Januar 1922 bis
1. Februar 1922. 9. Februar 1922 bis
1. März 1922. 10. März 1922 bis
1. April 1922. 11. April 1922 bis
1. Mai 1922. 12. Mai 1922 bis
1. Juni 1922. 13. Juni 1922 bis
1. Juli 1922. 14. Juli 1922 bis
1. August 1922. 15. August 1922 bis
1. September 1922. 16. September 1922 bis
1. Oktober 1922. 17. Oktober 1922 bis
1. November 1922. 18. November 1922 bis
1. Dezember 1922. 19. Dezember 1922 bis
1. Januar 1923. 20. Januar 1923 bis
1. Februar 1923. 21. Februar 1923 bis
1. März 1923. 22. März 1923 bis
1. April 1923. 23. April 1923 bis
1. Mai 1923. 24. Mai 1923 bis
1. Juni 1923. 25. Juni 1923 bis
1. Juli 1923. 26. Juli 1923 bis
1. August 1923. 27. August 1923 bis
1. September 1923. 28. September 1923 bis
1. Oktober 1923. 29. Oktober 1923 bis
1. November 1923. 30. November 1923 bis
1. Dezember 1923. 31. Dezember 1923 bis
1. Januar 1924. 1. Januar 1924 bis
1. Februar 1924. 2. Februar 1924 bis
1. März 1924. 3. März 1924 bis
1. April 1924. 4. April 1924 bis
1. Mai 1924. 5. Mai 1924 bis
1. Juni 1924. 6. Juni 1924 bis
1. Juli 1924. 7. Juli 1924 bis
1. August 1924. 8. August 1924 bis
1. September 1924. 9. September 1924 bis
1. Oktober 1924. 10. Oktober 1924 bis
1. November 1924. 11. November 1924 bis
1. Dezember 1924. 12. Dezember 1924 bis
1. Januar 1925. 13. Januar 1925 bis
1. Februar 1925. 14. Februar 1925 bis
1. März 1925. 15. März 1925 bis
1. April 1925. 16. April 1925 bis
1. Mai 1925. 17. Mai 1925 bis
1. Juni 1925. 18. Juni 1925 bis
1. Juli 1925. 19. Juli 1925 bis
1. August 1925. 20. August 1925 bis
1. September 1925. 21. September 1925 bis
1. Oktober 1925. 22. Oktober 1925 bis
1. November 1925. 23. November 1925 bis
1. Dezember 1925. 24. Dezember 1925 bis
1. Januar 1926. 25. Januar 1926 bis
1. Februar 1926. 26. Februar 1926 bis
1. März 1926. 27. März 1926 bis
1. April 1926. 28. April 1926 bis
1. Mai 1926. 29. Mai 1926 bis
1. Juni 1926. 30. Juni 1926 bis
1. Juli 1926. 31. Juli 1926 bis
1. August 1926. 1. August 1926 bis
1. September 1926. 2. September 1926 bis
1. Oktober 1926. 3. Oktober 1926 bis
1. November 1926. 4. November 1926 bis
1. Dezember 1926. 5. Dezember 1926 bis
1. Januar 1927. 6. Januar 1927 bis
1. Februar 1927. 7. Februar 1927 bis
1. März 1927. 8. März 1927 bis
1. April 1927. 9. April 1927 bis
1. Mai 1927. 10. Mai 1927 bis
1. Juni 1927. 11. Juni 1927 bis
1. Juli 1927. 12. Juli 1927 bis
1. August 1927. 13. August 1927 bis
1. September 1927. 14. September 1927 bis
1. Oktober 1927. 15. Oktober 1927 bis
1. November 1927. 16. November 1927 bis
1. Dezember 1927. 17. Dezember 1927 bis
1. Januar 1928. 18. Januar 1928 bis
1. Februar 1928. 19. Februar 1928 bis
1. März 1928. 20. März 1928 bis
1. April 1928. 21. April 1928 bis
1. Mai 1928. 22. Mai 1928 bis
1. Juni 1928. 23. Juni 1928 bis
1. Juli 1928. 24. Juli 1928 bis
1. August 1928. 25. August 1928 bis
1. September 1928. 26. September 1928 bis
1. Oktober 1928. 27. Oktober 1928 bis
1. November 1928. 28. November 1928 bis
1. Dezember 1928. 29. Dezember 1928 bis
1. Januar 1929. 30. Januar 1929 bis
1. Februar 1929. 31. Februar 1929 bis
1. März 1929. 1. März 1929 bis
1. April 1929. 2. April 1929 bis
1. Mai 1929. 3. Mai 1929 bis
1. Juni 1929. 4. Juni 1929 bis
1. Juli 1929. 5. Juli 1929 bis
1. August 1929. 6. August 1929 bis
1. September 1929. 7. September 1929 bis
1. Oktober 1929. 8. Oktober 1929 bis
1. November 1929. 9. November 1929 bis
1. Dezember 1929. 10. Dezember 1929 bis
1. Januar 1930. 11. Januar 1930 bis
1. Februar 1930. 12. Februar 1930 bis
1. März 1930. 13. März 1930 bis
1. April 1930. 14. April 1930 bis
1. Mai 1930. 15. Mai 1930 bis
1. Juni 1930. 16. Juni 1930 bis
1. Juli 1930. 17. Juli 1930 bis
1. August 1930. 18. August 1930 bis
1. September 1930. 19. September 1930 bis
1. Oktober 1930. 20. Oktober 1930 bis
1. November 1930. 21. November 1930 bis
1. Dezember 1930. 22. Dezember 1930 bis
1. Januar 1931. 23. Januar 1931 bis
1. Februar 1931. 24. Februar 1931 bis
1. März 1931. 25. März 1931 bis
1. April 1931. 26. April 1931 bis
1. Mai 1931. 27. Mai 1931 bis
1. Juni 1931. 28. Juni 1931 bis
1. Juli 1931. 29. Juli 1931 bis
1. August 1931. 30. August 1931 bis
1. September 1931. 31. September 1931 bis
1. Oktober 1931. 1. Oktober 1931 bis
1. November 1931. 2. November 1931 bis
1. Dezember 1931. 3. Dezember 1931 bis
1. Januar 1932. 4. Januar 1932 bis
1. Februar 1932. 5. Februar 1932 bis
1. März 1932. 6. März 1932 bis
1. April 1932. 7. April 1932 bis
1. Mai 1932. 8. Mai 1932 bis
1. Juni 1932. 9. Juni 1932 bis
1. Juli 1932. 10. Juli 1932 bis
1. August 1932. 11. August 1932 bis
1. September 1932. 12. September 1932 bis
1. Oktober 1932. 13. Oktober 1932 bis
1. November 1932. 14. November 1932 bis
1. Dezember 1932. 15. Dezember 1932 bis
1. Januar 1933. 16. Januar 1933 bis
1. Februar 1933. 17. Februar 1933 bis
1. März 1933. 18. März 1933 bis
1. April 1933. 19. April 1933 bis
1. Mai 1933. 20. Mai 1933 bis
1. Juni 1933. 21. Juni 1933 bis
1. Juli 1933. 22. Juli 1933 bis
1. August 1933. 23. August 1933 bis
1. September 1933. 24. September 1933 bis
1. Oktober 1933. 25. Oktober 1933 bis
1. November 1933. 26. November 1933 bis
1. Dezember 1933. 27. Dezember 1933 bis
1. Januar 1934. 28. Januar 1934 bis
1. Februar 1934. 29. Februar 1934 bis
1. März 1934. 30. März 1934 bis
1. April 1934. 31. April 1934 bis
1. Mai 1934. 1. Mai 1934 bis
1. Juni 1934. 2. Juni 1934 bis
1. Juli 1934. 3. Juli 1934 bis
1. August 1934. 4. August 1934 bis
1. September 1934. 5. September 1934 bis
1. Oktober 1934. 6. Oktober 1934 bis
1. November 1934. 7. November 1934 bis
1. Dezember 1934. 8. Dezember 1934 bis
1. Januar 1935. 9. Januar 1935 bis
1. Februar 1935. 10. Februar 1935 bis
1. März 1935. 11. März 1935 bis
1. April 1935. 12. April 1935 bis
1. Mai 1935. 13. Mai 1935 bis
1. Juni 1935. 14. Juni 1935 bis
1. Juli 1935. 15. Juli 1935 bis
1. August 1935. 16. August 1935 bis
1. September 1935. 17. September 1935 bis
1. Oktober 1935. 18. Oktober 1935 bis
1. November 1935. 19. November 1935 bis
1. Dezember 1935. 20. Dezember 1935 bis
1. Januar 1936. 21. Januar 1936 bis
1. Februar 1936. 22. Februar 1936 bis
1. März 1936. 23. März 1936 bis
1. April 1936. 24. April 1936 bis
1. Mai 1936. 25. Mai 1936 bis
1. Juni 1936. 26. Juni 1936 bis
1. Juli 1936. 27. Juli 1936 bis
1. August 1936. 28. August 1936 bis
1. September 1936. 29. September 1936 bis
1. Oktober 1936. 30. Oktober 1936 bis
1. November 1936. 31. November 1936 bis
1. Dezember 1936. 1. Dezember 1936 bis
1. Januar 1937. 2. Januar 1937 bis
1. Februar 1937. 3. Februar 1937 bis
1. März 1937. 4. März 1937 bis
1. April 1937. 5. April 1937 bis
1. Mai 1937. 6. Mai 1937 bis
1. Juni 1937. 7. Juni 1937 bis
1. Juli 1937. 8. Juli 1937 bis
1. August 1937. 9. August 1937 bis
1. September 1937. 10. September 1937 bis
1. Oktober 1937. 11. Oktober 1937 bis
1. November 1937. 12. November 1937 bis
1. Dezember 1937. 13. Dezember 1937 bis
1. Januar 1938. 14. Januar 1938 bis
1. Februar 1938. 15. Februar 1938 bis
1. März 1938. 16. März 1938 bis
1. April 1938. 17. April 1938 bis
1. Mai 1938. 18. Mai 1938 bis
1. Juni 1938. 19. Juni 1938 bis
1. Juli 1938. 20. Juli 1938 bis
1. August 1938. 21. August 1938 bis
1. September 1938. 22. September 1938 bis
1. Oktober 1938. 23. Oktober 1938 bis
1. November 1938. 24. November 1938 bis
1. Dezember 1938. 25. Dezember 1938 bis
1. Januar 1939. 26. Januar 1939 bis
1. Februar 1939. 27. Februar 1939 bis
1. März 1939. 28. März 1939 bis
1. April 1939. 29. April 1939 bis
1. Mai 1939. 30. Mai 1939 bis
1. Juni 1939. 31. Juni 1939 bis
1. Juli 1939. 1. Juli 1939 bis
1. August 1939. 2. August 1939 bis
1. September 1939. 3. September 1939 bis
1. Oktober 1939. 4. Oktober 1939 bis
1. November 1939. 5. November 1939 bis
1. Dezember 1939. 6. Dezember 1939 bis
1. Januar 1940. 7. Januar 1940 bis
1. Februar 1940. 8. Februar 1940 bis
1. März 1940. 9. März 1940 bis
1. April 1940. 10. April 1940 bis
1. Mai 1940. 11. Mai 1940 bis
1. Juni 1940. 12. Juni 1940 bis
1. Juli 1940. 13. Juli 1940 bis
1. August 1940. 14. August 1940 bis
1. September 1940. 15. September 1940 bis
1. Oktober 1940. 16. Oktober 1940 bis
1. November 1940. 17. November 1940 bis
1. Dezember 1940. 18. Dezember 1940 bis
1. Januar 1941. 19. Januar 1941 bis
1. Februar 1941. 20. Februar 1941 bis
1. März 1941. 21. März 1941 bis
1. April 1941. 22. April 1941 bis
1. Mai 1941. 23. Mai 1941 bis
1. Juni 1941. 24. Juni 1941 bis
1. Juli 1941. 25. Juli 1941 bis
1. August 1941. 26. August 1941 bis
1. September 1941. 27. September 1941 bis
1. Oktober 1941. 28. Oktober 1941 bis
1. November 1941. 29. November 1941 bis
1. Dezember 1941. 30. Dezember 1941 bis
1. Januar 1942. 31. Januar 1942 bis
1. Februar 1942. 1. Februar 1942 bis
1. März 1942. 2. März 1942 bis
1. April 1942. 3. April 1942 bis
1. Mai 1942. 4. Mai 1942 bis
1. Juni 1942. 5. Juni 1942 bis
1. Juli 1942. 6. Juli 1942 bis
1. August 1942. 7. August 1942 bis
1. September 1942. 8. September 1942 bis
1. Oktober 1942. 9. Oktober 1942 bis
1. November 1942. 10. November 1942 bis
1. Dezember 1942. 11. Dezember 1942 bis
1. Januar 1943. 12. Januar 1943 bis
1. Februar 1943. 13. Februar 1943 bis
1. März 1943. 14. März 1943 bis
1. April 1943. 15. April 1943 bis
1. Mai 1943. 16. Mai 1943 bis
1. Juni 1943. 17. Juni 1943 bis
1. Juli 1943. 18. Juli 1943 bis
1. August 1943. 19. August 1943 bis
1. September 1943. 20. September 1943 bis
1. Oktober 1943. 21. Oktober 1943 bis
1. November 1943. 22. November 1943 bis
1. Dezember 1943. 23. Dezember 1943 bis
1. Januar 1944. 24. Januar 1944 bis
1. Februar 1944. 25. Februar 1944 bis
1. März 1944. 26. März 1944 bis
1. April 1944. 27. April 1944 bis
1. Mai 1944. 28. Mai 1944 bis
1. Juni 1944. 29. Juni 1944 bis
1. Juli 1944. 30. Juli 1944 bis
1. August 1944. 31. August 1944 bis
1. September 1944. 1. September 1944 bis
1. Oktober 1944. 2. Oktober 1944 bis
1. November 1944. 3. November 1944 bis
1. Dezember 1944. 4. Dezember 1944 bis
1. Januar 1945. 5. Januar 1945 bis
1. Februar 1945. 6. Februar 1945 bis
1. März 1945. 7. März 1945 bis
1. April 1945. 8. April 1945 bis
1. Mai 1945. 9. Mai 1945 bis
1. Juni 1945. 10. Juni 1945 bis
1. Juli 1945. 11. Juli 1945 bis
1. August 1945. 12. August 1945 bis
1. September 1945. 13. September 1945 bis
1. Oktober 1945. 14. Oktober 1945 bis
1. November 1945. 15. November 1945 bis
1. Dezember 1945. 16. Dezember 1945 bis
1. Januar 1946. 17. Januar 1946 bis
1. Februar 1946. 18. Februar 1946 bis
1. März 1946. 19. März 1946 bis
1. April 1946. 20. April 1946 bis
1. Mai 1946. 21. Mai 1946 bis
1. Juni 1946. 22. Juni 1946 bis
1. Juli 1946. 23. Juli 1946 bis
1. August 1946. 24. August 1946 bis
1. September 1946. 25. September 1946 bis
1. Oktober 1946. 26. Oktober 1946 bis
1. November 1946. 27. November 1946 bis
1. Dezember 1946. 28. Dezember 1946 bis
1. Januar 1947. 29. Januar 1947 bis
1. Februar 1947. 30. Februar 1947 bis
1. März 1947. 31. März 1947 bis
1. April 1947. 1. April 1947 bis
1. Mai 1947. 2. Mai 1947 bis
1. Juni 1947. 3. Juni 1947 bis
1. Juli 1947. 4. Juli 1947 bis
1. August 1947. 5. August 1947 bis
1. September 1947. 6. September 1947 bis
1. Oktober 1947. 7. Oktober 1947 bis
1. November 1947. 8. November 1947 bis
1. Dezember 1947. 9. Dezember 1947 bis
1. Januar 1948. 10. Januar 1948 bis
1. Februar 1948. 11. Februar 1948 bis
1. März 1948. 12. März 1948 bis
1. April 1948. 13. April 1948 bis
1. Mai 1948. 14. Mai 1948 bis
1. Juni 1948. 15. Juni 1948 bis
1. Juli 1948. 16. Juli 1948 bis
1. August 1948. 17. August 1948 bis
1. September 1948. 18. September 1948 bis
1. Oktober 1948. 19. Oktober 1948 bis
1. November 1948. 20. November 1948 bis
1. Dezember 1948. 21. Dezember 1948 bis
1. Januar 1949. 22. Januar 1949 bis
1. Februar 1949. 23. Februar 1949 bis
1. März 1949. 24. März 1949 bis
1. April 1949. 25. April 1949 bis
1. Mai 1949. 26. Mai 1949 bis
1. Juni 1949. 27. Juni 1949 bis
1. Juli 1949. 28. Juli 1949 bis
1. August 1949. 29. August 1949 bis
1. September 1949. 30. September 1949 bis
1. Oktober 1949. 31. Oktober 1949 bis
1. November 1949. 1. November 1949 bis
1. Dezember 1949. 2. Dezember 1949 bis
1. Januar 1950. 3. Januar 1950 bis
1. Februar 1950. 4. Februar 1950 bis
1. März 1950. 5. März 1950 bis
1. April 1950. 6. April 1950 bis
1. Mai 1950. 7. Mai 1950 bis
1. Juni 1950. 8. Juni 1950 bis
1. Juli 1950. 9. Juli 1950 bis
1. August 1950. 10. August 1950 bis
1. September 1950. 11. September 1950 bis
1. Oktober 1950. 12. Oktober 1950 bis
1. November 1950. 13. November 1950 bis
1. Dezember 1950. 14. Dezember 1950 bis
1. Januar 1951. 15. Januar 1951 bis
1. Februar 1951. 16. Februar 1951 bis
1. März 1951. 17. März 1951 bis
1. April 1951. 18. April 1951 bis
1. Mai 1951. 19. Mai 1951 bis
1. Juni 1951. 20. Juni 1951 bis
1. Juli 1951. 21. Juli 1951 bis
1. August 1951. 22. August 1951 bis
1. September 1951. 23. September 1951 bis
1. Oktober 1951. 24. Oktober 1951 bis
1. November 1951. 25. November 1951 bis
1. Dezember 1951. 26. Dezember 1951 bis
1. Januar 1952. 27. Januar 1952 bis
1. Februar 1952. 28. Februar 1952 bis
1. März 1952. 29. März 1952 bis
1. April 1952. 30. April 1952 bis
1. Mai 1952. 31. Mai 1952 bis
1. Juni 1952. 1. Juni 1952 bis
1. Juli 1952. 2. Juli 1952 bis
1. August 1952. 3. August 1952 bis
1. September 1952. 4. September 1952 bis
1. Oktober 1952. 5. Oktober 1952 bis
1. November 1952. 6. November 1952 bis
1. Dezember 1952. 7. Dezember 1952 bis
1. Januar 1953. 8. Januar 1953 bis
1. Februar 1953. 9. Februar 1953 bis
1. März 1953. 10. März 1953 bis
1. April 1953. 11. April 1953 bis
1. Mai 1953. 12. Mai 1953 bis
1. Juni 1953. 13. Juni 1953 bis
1. Juli 1953. 14. Juli 1953 bis
1. August 1953. 15. August 1953 bis
1. September 1953. 16. September 1953 bis
1. Oktober 1953. 17. Oktober 1953 bis
1. November 1953. 18. November 1953 bis
1. Dezember 1953. 19. Dezember 1953 bis
1. Januar 1954. 20. Januar 1954 bis
1. Februar 1954. 21. Februar 1954 bis
1. März 1954. 22. März 1954 bis
1. April 1954. 23. April 1954 bis
1. Mai 1954. 24. Mai 1954 bis
1. Juni 1954. 25. Juni 1954 bis
1. Juli 1954. 26. Juli 1954 bis
1. August 1954. 27. August 1954 bis
1. September 1954. 28. September 1954 bis
1. Oktober 1954. 29. Oktober 1954 bis
1. November 1954. 30. November 1954 bis
1. Dezember 1954. 31. Dezember 1954 bis
1. Januar 1955. 1. Januar 1955 bis
1. Februar 1955. 2. Februar 1955 bis
1. März 1955. 3. März 1955 bis
1. April 1955. 4. April 1955 bis
1. Mai 1955. 5. Mai 1955 bis
1. Juni 1955. 6. Juni 1955 bis
1. Juli 1955. 7. Juli 1955 bis
1. August 1955. 8. August 1955 bis
1. September 1955. 9. September 1955 bis
1. Oktober 1955. 10. Oktober 1955 bis
1. November 1955. 11. November 1955 bis
1. Dezember 1955. 12. Dezember 1955 bis
1. Januar 1956. 13. Januar 1956 bis
1. Februar 1956. 14. Februar 1956 bis
1. März 1956. 15. März 1956 bis
1. April 1956. 16. April 1956 bis
1. Mai 1956. 17. Mai 1956 bis
1. Juni 1956. 18. Juni 1956 bis
1. Juli 1956. 19. Juli 1956 bis
1. August 1956. 20. August 1956 bis
1. September 1956. 21. September 1956 bis
1. Oktober 1956. 22. Oktober 1956 bis
1. November 1956. 23. November 1956 bis
1. Dezember 1956. 24. Dezember 1956 bis
1. Januar 1957. 25. Januar 1957 bis
1. Februar 1957. 26. Februar 1957 bis
1. März 1957. 27. März 1957 bis
1. April 1957. 28. April 1957 bis
1. Mai 1957. 29. Mai 1957 bis
1. Juni 1957. 30. Juni 1957 bis
1. Juli 1957. 31. Juli 1957 bis
1. August 1957. 1. August 1957 bis
1. September 1957. 2. September 1957 bis
1. Oktober 1957. 3. Oktober 1957 bis
1. November 1957. 4. November 1957 bis
1. Dezember 1957. 5. Dezember 1957 bis
1. Januar 1958. 6. Januar 1958 bis
1. Februar 1958. 7. Februar 1958 bis
1. März 1958. 8. März 1958 bis
1. April 1958. 9. April 1958 bis
1. Mai 1958. 10. Mai 1958 bis
1. Juni 1958. 11. Juni 1958 bis
1. Juli 1958. 12. Juli 1958 bis
1. August 1958. 13. August 1958 bis
1. September 1958. 14. September 1958 bis
1. Oktober 1958. 15. Oktober 1958 bis
1. November 1958. 16. November 1958 bis
1. Dezember 1958. 17. Dezember 1958 bis
1. Januar 1959. 18. Januar 1959 bis
1. Februar 1959. 19. Februar 1959 bis
1. März 1959. 20. März 1959 bis
1. April 1959. 21. April 1959 bis
1. Mai 1959. 22. Mai 1959 bis
1. Juni 1959. 23. Juni 1959 bis
1. Juli 1959. 24. Juli 1959 bis
1. August 1959. 25. August 1959 bis
1. September 1959. 26. September 1959 bis
1. Oktober 1959. 27. Oktober 1959 bis
1. November 1959. 28. November 1959 bis
1. Dezember 1959. 29. Dezember 1959 bis
1. Januar 1960. 30. Januar 1960 bis
1. Februar 1960. 31. Februar 1960 bis
1. März 1960. 1. März 1960 bis
1. April 1960. 2. April 1960 bis
1. Mai 1960. 3. Mai 1960 bis
1. Juni 1960. 4. Juni 1960 bis
1. Juli 1960. 5. Juli 1960 bis
1. August 1960. 6. August 1960 bis
1. September 1960. 7. September 1960 bis
1. Oktober 1960. 8. Oktober 1960 bis
1. November 1960. 9. November 1960 bis
1. Dezember 1960. 10. Dezember 1960 bis
1. Januar 1961. 11. Januar 1961 bis
1. Februar 1961. 12. Februar 1961 bis
1. März 1961. 13. März 1961 bis
1. April 1961. 14. April 1961 bis
1. Mai 1961. 15. Mai 1961 bis
1. Juni 1961. 16. Juni 1961 bis
1. Juli 1961. 17. Juli 1961 bis
1. August 1961. 18. August 1961 bis
1. September 1961. 19. September 1961 bis
1. Oktober 1961. 20. Oktober 1961 bis
1. November 1961. 21. November 1961 bis
1. Dezember 1961. 22. Dezember 1961 bis
1. Januar 1962. 23. Januar 1962 bis
1. Februar 1962. 24. Februar 1962 bis
1. März 1962. 25. März 1962 bis
1. April 1962. 26. April 1962 bis
1. Mai 1962. 27. Mai 1962 bis
1. Juni 1962. 28. Juni 1962 bis
1. Juli 1962. 29. Juli 1962 bis
1. August 1962. 30. August 1962 bis
1. September 1962. 31. September 1962 bis
1. Oktober 1962. 1. Oktober 1962 bis
1. November 1962. 2. November 1962 bis
1. Dezember 1962. 3. Dezember 1962 bis
1. Januar 1963. 4. Januar 1963 bis
1. Februar 1963. 5. Februar 1963 bis
1. März 1963. 6. März 1963 bis
1. April 1963. 7. April 1963 bis
1. Mai 1963. 8. Mai 1963 bis
1. Juni 1963. 9. Juni 1963 bis
1. Juli 1963. 10. Juli 1963 bis
1. August 1963. 11. August 1963 bis
1. September 1963. 12. September 1963 bis
1. Oktober 1963. 13. Oktober 1963 bis
1. November 1963. 14. November 1963 bis
1. Dezember 1963. 15. Dezember 1963 bis
1. Januar 1964. 16. Januar 1964 bis
1. Februar 1964. 17. Februar 1964 bis
1. März 1964. 18. März 1964 bis
1. April 1964. 19. April 1964 bis
1. Mai 1964. 20. Mai 1964 bis
1. Juni 1964. 21. Juni 1964 bis
1. Juli 1964. 22. Juli 1964 bis
1. August 1964. 23. August 1964 bis
1. September 1964. 24. September 1964 bis
1. Oktober 1964. 25. Oktober 1964 bis
1. November 1964. 26. November 1964 bis
1. Dezember 1964. 27. Dezember 1964 bis
1. Januar 1965. 28. Januar



Literat

- G l a s s e r, E. "Zur Frage der selbständigen Ätiologie des Waterhouse-Friderichsen Syndroms." (Sonderdruck)
- H e d r i c h, A. R. "Gegenwärtige Erkenntnisse der Meningokokkenkrankheit." Tubl. Welt 10, 67, 41-20, 1952.
- H o e n, E. "Anaphylaktische Reaktion bei intrathekaler Penicillingabe." Dtsch. Med. Wschr. 1952
- H o p p e, Th. "Zur Behandlung der klinischen Meningitis epidemica mit Eubasin und Akto-cid." Dtsch. Med. Wschr. 1, 39-41, 1941.
- H o r a c e, L., H o d e s, R., M e l l e, E., S a r a s a t i, J. "Pulmination of meningococcal sepsis with cortisone, use of blood culture plate count as a guide to prognosis and treatment." Pediatrics 10, 157-67, 1950.
- J a n i s e k, I. Marischke, F. "Klinisch-statistische Untersuchungen über Behandlungsergebnisse der Meningitis epidemica." Dtsch. Ztbl. d. Kinderheilk. 7, 392-93, 1952.
- L e d e n t u, "La meningite cérébro-spinale en Afrique Equatoriale Française pendant le première semestre 1939." Bull. mens. Off. internat. Hyg. publ. 33, 421-50, 1941.
- L o s s e n, "Meningokokkenzephal nach Meningitis epidem., nebst Bemerkungen über Max-these bei Meningokokkeninfektionen." Dtsch. Med. Wschr., 285-90, 1942
- L u z, K. "Das Meningokokkenträgerproblem." Münch. Med. Wschr. 1, 30-32, 1940

Lebenslauf.

Am 4.7.23 wurde ich, Christiane, Eleonore, Rose Wolt, als erstes Kind des Bahnseernten Heinrich Wolt und seiner Ehefrau Wanda, geb. Jorge, zu Alt-Strunz, Kreis Glogau, in Schlesien geboren. 1930 erfolgte meine Aufnahme in die dortige Grundschule. Infolge Versetzung meines Vaters zogen wir im Herbst des Jahres 35 nach Sonnagorei, Kreis Ost-Sternberg in Brandenburg. Unser nächster Wohnsitz wurde im Sommer des Jahres 32 Gross-Gandern, Kreis West-Sternberg. Von dort aus begann ich Ostern des Jahres 35 mit dem Besuch der Mittelschule zu Reppen. Eine von meinem Vater gewünschte Versetzung in unsere Heimat führte uns im Dezember 1936 nach Driesbitz, Kreis Fraustadt. Von diesem Zeitpunkte an besuchte ich bis Ostern 1940 die Oberschule für Frauen zu Glogau. Das änderte sich auch nicht als wir 1939 für ein halbes Jahr nach Schlesiersee, Kreis Glogau, übersiedeln mussten. Wir kehrten Anfang 1940 nach Driesbitz zurück. Ostern 1940 wechselte ich die Schule, weil für das Studium der Medizin das Latein erforderlich war. Ich trat in die Oberschule für Jungen zu Fraustadt ein. An dieser Schule wurde von mir im Februar 1943 die Reifeprüfung abgelegt. Nach Ableistung von Arbeits- und Kriegshilfsdienst immatrikulierte ich im April 1944 an der Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau und begann im Mai mit dem Studium der Medizin. Zum Wintersemester 44 waren nur noch Studierende, die in Examen standen oder der Wehrmacht angehörten zugelassen. Daher arbeitete ich ab September 44 als Schwesterhelferin im Hauptlazarett Glogau bis wir im Januar 45, als Glogau zur Festung erklärt wurde, mit unseren Patienten nach Westdeutschland evakuiert wurden. Nach einem Zwischenaufenthalt in Sassen trafen wir im Oktober 45 in Waldeck an der Eder ein, wo mein Vater, von der Bundesbahndirektion Kassel eingesetzt ward. Im Juni 1946 erteilte mir die Johann-Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt die Wiederzulassung zum Studium, das im Wintersemester 1950/51 mit dem Staatsexamen abgeschlossen

wurde. Von Juni 51 - Oktober 54 war ich in den Universitätskliniken zu Frankfurt tätig. In diesem Zeitraum übernahm ich auch die Praxis eines niedergelassenen Vertretungen praktischer Ärzte und wurde dabei in absehbarer Zeit selbst als praktischer Arzt zu niederlassen.

